EUROPLANT

# COLUMBIA



## Patata semiprecoz, principalmente para cocer

- Carne de color amarillo
- Tubérculos de forma semi-oblonga
- Grandes calibre
- Rendimientos elevados

# COLUMBIA

EUROPLANT

COLUMBIA - tubérculos atractivos y de buen calibre

| **Recomendaciones de cultivo** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Requisitos del campo** | Recomendable un terreno bueno a medio con suministro regular de agua y nutrientes | | | |
| **Siembra** | **Calibre 35/50** | **Distancia entre plantas** | | **Tubérculos por hectárea** |
| | | **75 cm** | **90 cm** | |
| | | 32-34 cm | 27-28 cm | 40.400 |
| | | para calibres grandes: +2 cm | | |
| | **Profundidad (siembra)** | Estándar | | |
| | **Preparación (semilla)** | Buena dormancia; se recomienda la estimulación uniforme de brotes 7-10 días antes de sembrar | | |
| | **Tratamiento de la semilla** | Se recomienda tratamiento preventivo contra Rhizoctonia solani | | |
| **Herbicidas** | Usado correctamente, no es sensible a Metribuzina en pre-emergencia; sensibilidad media a Metribuzina en post-emergencia | | | |
| **Sanidad foliar** | Sanidad foliar media; es RECOMENDABLE el uso puntual y regular de fungicidas contra mildiu | | | |
| **Cosecha** | Asegurar una recolección suave | | | |
| **Fertilización** incl. abonado del anterior cultivo para un rendimiento medio | | | | |
| **Nitrógeno (N)** | alto - comparado con el estándar local (2/3 abonado de fondo y 1/3 en cobertera) | | | |
| **Fósforo ($P_2O_5$)** | 100 kg/ha (Fosfato soluble en agua en la siembra) | | | |
| **Potasio ($K_2O$)** | 350-270 kg/ha (Acepta hasta 80 kg/ha en forma de cloruro; en suelos más ligeros fraccionar dosis) | | | |
| **Magnesio (MgO)** | 70 kg/ha (Para asegurar rendimiento y calidad) | | | |
| **Características varietales** | | | | |
| **Madurez** | semiprecoz | **Tubérculo** | | |
| **Tipo culinario** | B | Forma del tubérculo | oval | |
| **Calidad para el consumo** | Variedad de cocción sabrosa con baja decoloración tras cocción | Profundidad de ojos<br>Color de la carne<br>Color de la piel<br>Tipo de piel<br>Tuberización | poco profundos<br>amarilla<br>amarilla<br>lisa<br>media - alta | |
| **Rendimiento** | Tubérculos con alta producción y alta proporción comercializable | **Resistencias** | | |
| | | PCN (Nemátodos)<br>Sarna verrugosa | Ro1 (7)<br>1 (a) | |
| **Desarrollo inicial** | Vigoroso | **Sensibilidades** | | |
| **Almacenamiento** | Buena dormición | Sarna común<br>Necrosis<br>Golpe interno<br>Daños mecánicos | baja<br>muy baja - baja<br>baja<br>baja - media | |

* estudios preliminares | (a) pocas sensibilidades

Todos los detalles se basan en pruebas de variedades certificadas y en nuestra propia experiencia. Sin embargo, como las patatas son productos naturales, no podemos asumir ninguna responsabilidad por estos datos. (09/2025)

EUROPLANT España Semillas S.L. | C/Artesanía, 2 Local 2 | 41120 – Gelves (SEVILLA) |
Tel. +34 954 733477 | info@europlant.es | www.europlant.es