



EUROPLANT

WIEMY CO SADZIĆ!

# Bernina

**średnio wczesna  
odmiana sałatkowa**

- intensywnie żółty kolor miąższu
- bulwy ładne, podłużno owalne
- wysoki plon handlowy



**BARDZO  
DŁUGIE  
PRZECHOWY-  
WANIE**


# Bernina

- Odmiana średnio wczesna (90-120 dni wegetacji), bardzo plenna, lekko sałatkowa – typ AB,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

## GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	15-17 cm	13-14 cm
	35/55	27-30 cm	22-24 cm
+60	28/35	18-20 cm	15-16 cm
	35/55	32-34 cm	25-27 cm

## GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: SADZIĆ 3 CM GŁĘBIEJ



## Nawożenie

- N 120-140 kg/ha, łącznie z N min. (zaleca się podzielenie azotu na 2 dawki: 3/4 przed sadzeniem i 1/4 pogłównie),
- $K_2O$  280-300 kg/ha (jako  $K_2SO_4$ ) – odmiana tolerancyjna na suszę, jednak przy nawadnianiu stosować nawożenie potasem w dwóch dawkach 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie,
- $P_2O_5$  80 kg/ha,
- $MgO$  60 kg/ha.

## Uwagi

- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Stosować pobudzenie bulw,
- Po wschodach BERNINA wykazuje średnią wrażliwość na metrybuzynę, dlatego nie powinno się środków opartych na tej substancji stosować powschodowo (jeżeli jednak zajdzie taka konieczność należy podzielić dawkę, stosując jednorazowo maks. 200 g środka i po 4-5 dniach zabieg powtórzyć),
- BERNINA ma mniejsze o ok. 20 % zapotrzebowanie na azot w porównaniu do innych odmian z tego segmentu,
- Odmiana jest wrażliwa na zarazę ziemniaka, zarówno liści, jak i bulw, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw.

