



Albertine

ogólnoużytkowa (typ B),
bardzo wczesna odmiana jadalna

nowość

- bardzo ładny optycznie wygląd,
- szybko dojrzewająca,
- gładka skórka.

ZALECENIA UPRAWOWE:

Wymagania stanowiskowe:

– preferuje średnie stanowiska z dobrym i równomiernym zaopatrzeniem w wodę i pozostałe składniki pokarmowe.

Sadzenie – 35/50 mm, w rozstawie rzędów 75 cm, w rzędzie co 32 – 34 cm (ok. 38 tys. roślin/ha), przy późniejszym zbiorze 2 cm gęściej, ze względu na wyraźny spoczynek kielków zaleca się podkielkowywanie lub pobudzanie bulw przed wysadzeniem (3-4 dni), głębokość sadzenia standardowa, przygotowanie stanowiska - standardowo. Zaleca się zaprawianie bulw przeciw ryzoktoniozie.

Herbicydy – jak do tej pory nie stwierdzono szczególnej wrażliwości na metrybuzynę, przy prawidłowo wykonanym zabiegu przed wschodami roślin,

Zdrowotność roślin – średnia zdrowotność,

Nawożenie:

Azot – do 160 kg (łącznie z Nmin. , nawożeniem organicznym i korektą ze względu na stanowisko). Przy wczesnym zbiorze, całość dawki przed sadzeniem.

Potas- K2O 200-250 kg/ha, preferowana forma siarczanowa,

Fosfor P2O5 - 100 kg/ha w formie rozpuszczalnej w wodzie przed sadzeniem,

Magnez- 60 kg/ha dla zapewnienia ilości i jakości plonu.

Ogólnie nie zaleca się nawożenia dolistnego, jedynie uzupełniająco na słabszych stanowiskach.

Dojrzałość	bardzo wczesna, na początek zbiorów sezonu ziemniaczanego	Bulwy Kształt Głębokość oczek Barwa miąższu Skórka	owalny płytkie żółty gładka
Walory kulinarne	Odmiana ogólnoużytkowa typ B, żółty miąższ		
Plon	średni, w wyjątkowo wyrównanym kalibrażu	Oporność Nicienie*	Nicienie – Ro 1(9), Ro 4(9)*
Wschody	szybkie	Podatność Parch Rdzawa plamistość Obicia Uszkodzenia	średnia do niskiej, niska bardzo niska niska do średniej
Przechowywanie	długi okres spoczynku, do wiosny		

* tymczasowo

Dane w opisie pochodzą z oficjalnych badań odmianowych oraz z własnych doświadczeń. Ziemiaki, jako że są produktem naturalnym, nie mogą przyjąć całkowitej odpowiedzialności za opisane dane.