

# Red Sonia

bardzo wczesna odmiana ogólnoużytkowa

- wczesny czas dojrzewania
- czerwona, gładka skórka
- wyrównane bulwy z płytkimi oczkami
- żółty, smaczny miąższ



# Red Sonia

bardzo wczesny, czerwony ziemniak jadalny

## Zalecenia uprawowe:

**Red Sonia** ma wymagania średnie do wysokich. Wymaga jednolitego zaopatrzenia w wodę i składniki odżywcze oraz stanowiska w dobrej kulturze rolnej. Przy uprawie pod osłonami wymaga podkielkowania, a bez osłon sadzeniaki należy pobudzić. Wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo.

## Wymagania szczególne:

**Red Sonia** tworzy średnią liczbę bulw, więc odległość roślin w rzędzie musi być odpowiednio zaplanowana. Standardowe odległości sadzenia (75 cm rzędy) bulwy 30 do 32 cm (~ 43.000 roślin/ha). **Red Sonia** jest wdzięczna za zrównoważone nawożenie. Azot o łącznej wartości w czystym składniku do 160 kg/ha (w tym zasobność po przedplonie +/- korekta stanowiska). Potas 200 - 250 kg/ha i fosfor 100 kg/ha. Magnez 60 kg oraz mikroelementy dostosować do stanowiska i wymagań jakościowych plonu. Sadzeniaki należy zaprawiać i stosować pełną profilaktykę fungicydową. Po osiągnięciu dojrzałości **Red Sonia** wymaga 3 tygodni do pełnego skorkowacenia skórki.

Wczesność	bardzo wczesna	Bulwy Kształt Głębokość oczek Barwa mięszu Skórka	owalne płytkie żółty gładka, czerwona
Walory kulinarne	Typ kulinarny B, ogólnoużytkowy brak ciemnienia po ugotowaniu	Odporność Nicienie Wirusy Zaraza	Ro 1-5 wysoka średnia
Wschody	szybkie	Podatność Parch Rdzawa plamistość Czarna plamistość Uszkodzenia	nieznaczna nieznaczna nieznaczna nieznaczna
Przechowywanie	długi spoczynek kielków dobre przechowywanie		

**Red Sonia** bardzo smaczny ziemniak o pięknej czerwonej skórce.