



Red Sonia

bardzo wczesna odmiana
ogólnoużytkowa



NAJSMACZNIEJSZA

- wczesny czas dojrzewania
- czerwona, gładka skórka
- wyrównane bulwy z płytkimi oczkami
- żółty, smaczny miąższ


Red Sonia

- Odmiana bardzo wczesna (80-95 dni wegetacji), w typie kulinarnym B (ogólnoużytkowy),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Sadzenie w dobrze ogrzaną, suchą i spulchnioną na głębokość minimum 20 cm glebę.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	16-18 cm	13-15 cm
	35/55	30-32 cm	25-27 cm
+60	28/35	19-20 cm	16-17 cm
	35/55	33-35 cm	28-29 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 150-160 kg/ha, łącznie z N min. (w formie amonowej, nie azotanowej),
- P_2O_5 90 kg/ha,
- K_2O 200-220 kg/ha, jako K_2SO_4 (do 100 kg/ha możliwe w dawce w postaci chlorkowej),
- MgO 60 kg/ha.

Uwagi

- RED SONIA wymaga lepszych stanowisk, z odpowiednio zapewnioną wilgotnością,
- Sadzeniaki należy przed sadzeniem pobudzić, aby przyspieszyć wschody i wzrost roślin,
- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- RED SONIA jest średnio wrażliwa na metrybuzynę, stosowaną przedwschodowo, jednak wrażliwa na stosowaną powschodowo, dlatego należy unikać jej stosowania po wschodach,
- Odmiana jest wrażliwa na zarzę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw,
- Zaleca się wykonać 2 zabiegi dolistnego dokarmiania roślin fosforem i potasem po kwitnieniu,
- Zbiór wykonywać przy pełnej dojrzałości skórki (w trakcie pocierania palcem skórka nie łuszczy się).

