



## Sanibel

bardzo wczesna odmiana  
o czerwonej skórce

**nowość**

- typ ogólnoużytkowy B,
- wczesnie tworzy plon handlowy,
- gładka skórka, płytkie oczka.

**nowość****Sanibel**

ogólnoużytkowa, bardzo wczesna odmiana jadalna o czerwonej skórce.  
 Uzupełnia segment odmian bardzo wczesnych, o czerwonej skórce  
 i bardzo ładnym wyglądzie bulw.

**Wymagania glebowe:**

średnie odnośnie stanowiska i zaopatrzenia w wodę.

**Wymagania szczególne:**

**Sadzenie** – 35/55 mm, w rozstawie rzędów 75 cm, powinno się ją wysadzać w rzędzie co 30-32 cm (ok. 43 tys. roślin/ha), głębokość sadzenia, przygotowanie stanowiska, zaprawianie bulw - standardowo.

Herbicydy – jest wrażliwa na metrybuzynę, zabieg przed wschodami musi być odpowiednio wcześniej wykonany, nie stosować po wschodach.

Zdrowotność roślin – zaleca się standardowe zabiegi przeciw zarazie ziemniaka.

**Nawożenie** – Azot – do 160 kg (łącznie z Nmin., nawożeniem organicznym i korektą ze względu na stanowisko). Na stanowiskach, gdzie istnieje możliwość wymywania, dawki powyżej 80 kg należy dzielić, Potas- K<sub>2</sub>O 200-250 kg/ha, dopuszczalna część dawki w formie siarczanowej – do 80 kg, Fosfor P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> - 100 kg/ha w formie rozpuszczalnej w wodzie przed sadzeniem, Magnez- 60 kg/ha.

Dojrzałość	bardzo wczesna	Bulwy Kształt	owalny do okrągło owalnego
Walory kulinarne	odmiana ogólnoużytkowa, jasnożółty miąższ	Głębokość oczek Barwa miąższu Skórka	plytkie jasnożółta czerwona, gładka
Plon	wysoki	Odporność Nicienie Rak ziemniaka	Ro 1 (9) D1
Wschody	szybkie	Podatność Parch Rdzawa plamistość Obicia Uszkodzenia	niska niska do średniej niska niska do średniej
Przechowywanie	średni okres spoczynku		

Dane w opisie pochodzą z oficjalnych badań odmianowych oraz z własnych doświadczeń. Ziemiaki, jako że są produktem naturalnym, nie mogą przyjąć całkowitej odpowiedzialności za opisane dane.