

Sorten, Kompetenz & Service


Constantina



vorwiegend festkochende Speisesorte

- mittelfrühe Reifezeit
- hellgelbe Fleischfarbe
- glatte Schale, ansprechende Optik

Optisch ansprechende, grobfallende Knollen mit sehr guten Wascheigenschaften

Anbauempfehlung		mehr Info	
Standortansprüche	mittlere Standorte mit einer sicheren Wasserversorgung und einer gleichmäßigen Nährstoffnachlieferung		
Pflanzung	35/50	28 - 30 cm (~46.000 Pflanzen/ha); für grob fallende Ware gerne etwas weiter pflanzen (+ 2 - 4 cm)	
	Pflanztiefe	Standard; 17 cm Erdbedeckung zum Häufeln	
	Vorbereitung	Standard	
Beizung	Beizung gegen Rhizoctonia wird empfohlen; Verträglichkeit der Beizung ist zu prüfen		
Herbizide	eine besondere Empfindlichkeit gegenüber Metribuzin ist bei sachgerechter Anwendung nicht bekannt		
Blattgesundheit	regelmäßige Krautfäulebehandlungen sind in normalen Spritzfolgen zu empfehlen; Alternariaprophylaxe ist zu empfehlen		
Düngung		inkl. Rücklieferung Vorfrucht	
Stickstoff	160 kg/ha inkl. N _{min} ^r inkl. org. Düngung	auf auswaschungsgefährdeten Standorten Gaben über 80 kg N/ha splitten	
Phosphor	100 kg/ha	wasserlösliches Phosphat zum Pflanzen	
Kalium	250 - 300 kg/ha	qualitätsbetonte Kaliumdüngung; bis 150 kg auch als chlorid möglich	
Magnesium	60 kg /ha	Ertrags- und Qualitätssicherung	
Sorteneigenschaften			
Reife	mittelfrüh	Knolle	oval flach hellgelb glatt - leicht genetzt
Speisewert	vorwiegend festkochend; hellgelbe Fleischfarbe		
Ertrag	mittlere bis hohe Erträge mit großfallender Sortierung	Resistenzen	Ro 1 - 3 (alle 9) * D1 (10), NL18 (10) 8
Jugend	zügig		
Lagerung	keimruhig bis an das Frühjahr	Anfälligkeiten	gering gering - mittel sehr gering - gering gering - mittel
		Schorf Eisenfleckigkeit Schwarzfleckigkeit Beschädigung	

*) vorläufig