

EUROPLANT

Amado

**średnio późna do późnej odmiana,
wysoko skrobiowa**

- wysoki plon skrobi netto z ha
- odporna na nicienie
- biały miąższ

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193, +48 94 347 34 61


Amado

- Odmiana średnio późna, **skrobiowa**
- Odmiana plenna o wysokiej zawartości skrobi, preferuje stanowiska słabsze do średnich,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20-25 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów		Obsada roślin/ha
		75 cm	90 cm	
+35	28/35	17-18 cm	14-15 cm	61-67.000
	35/55	34-36 cm	28-30 cm	37-39.000

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie

- N 140-160 kg/ha, łącznie z $N_{min.}$ (w formie amonowej lub amidowej), przy nawadnianiu zaleca się dzielenie dawki na 3/4 przed sadzeniem i 1/4 pogłównie. Bez nawadniania korzystniejszym jest stosowanie azotu w ustabilizowanej formie np. amidowej,
- P_2O_5 80 kg/ha (warto zastosować 30-40% z zalecanej dawki pogłównie – zwiększa to liczbę bulw, ich dojrzałość i zawartość skrobi),
- K_2O 200-220 kg/ha (jako K_2SO_4, przy nawadnianiu dobre korzyści przynosi dzielenie dawki w proporcjach: 1/2 przed sadzeniem i 1/2 przed zwarciem rzędów),
- MgO 60 kg/ha.

Uwagi (dla plonu 50 t/ha)

- Stosować pobudzanie bulw 4-5 dni przed sadzeniem, aby uzyskać max. 3-4 mm silne kiełki,
- Zaleca się zaprawianie bulw, z preferencją aplikowania zaprawy w trakcie sadzenia bezpośrednio do redlin. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- AMADO nie jest wrażliwa na metrybuzynę przy stosowaniu przedwschodowym, natomiast jest średnio wrażliwa przy stosowaniu powschodowo, dlatego gdy rośliny ziemniaka są już na wierzchu zaleca się dzielić oprysk na 2 dawki po 200 g (drugi zabieg po 4-5 dniach),
- Po zawiązaniu bulw zaleca się 1 lub 2 zabiegi dolistnie NPK,
- Odmiana jest wrażliwa na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się wczesne i systematyczne stosowanie preparatów grzybobójczych przez cały okres wegetacji aż do momentu zbioru bulw.

