

Anuschka

bardzo wczesna, do wczesnej
jadalna odmiana sałatkowa, typ AB

WCZESNA

- żółty miąższ
- wysoka jakość typu sałatkowego
- odpowiedni kształt bulw
- gładka skórka, płytkie oczka
- bardzo wysoki plon handlowy
- bardzo odporna na wtórny wzrost bulw

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193, +48 94 347 34 61


Anuschka

- Odmiana bardzo wczesna do wczesnej (85-95 dni wegetacji),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18 cm	14 cm
	35/55	32-33 cm	26-27 cm
+60	28/35	20 cm	16 cm
	35/55	34-36 cm	27-28 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 130-140 kg/ha łącznie z N min., (forma amonowa lub amidowa w zależności od rodzaju gleby, regionu, kalibrażu),
- P_2O_5 90 kg/ha,
- K_2O 220-250 kg/ha, (jako K_2SO_4),
- MgO 60 kg/ha.

Uwagi

- Należy unikać stanowisk sprzyjających występowaniu rdzawej plamistości bulw,
- Stosować pobudzanie bulw, należy **bezwzględnie unikać** obłamywania kiełków,
- Temperatura ziemi podczas sadzenia powinna wynosić ≥ 8 stopni Celsjusza,
- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- ANUSCHKA wykazuje lekką wrażliwość na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych,
- Odmiana jest lekko wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne – zbiór oraz dalsze sortowanie i pakowanie należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności,
- Zastosowanie odpornych międzyplonów w celu zwalczania nicieni (np. rzodkiew oleista) wywołuje efekt biofumigacji. Poprzez wymieszanie rozdrobnionych roślin z glebą wydzielają się izotiocyjaniany, które skutecznie zwalczają szkodniki odglebowe.

