WIEMY CO **SADZIĆ**!

EUROPLANT



Bellarosa

wczesna odmiana jadalna, typ B

- czerwona skórka
- bardzo dobra trwałość przechowalnicza
- wyjątkowy smak
- córka odmiany Vineta
- bardzo duże bulwy

WYSOKI PLON

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193, +48 94 347 34 61


Bellarosa

- BELLAROSA odmiana bardzo wczesna (75-80 dni wegetacji), typ B – ogólnoużytkowy,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Wymagania glebowe: niskie do średnich,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	13-15 cm	11-13 cm
	35/55	22-24 cm	18-20 cm
+60	28/35	16-18 cm	13-15 cm
	35/55	28-30 cm	23-25 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 110-120 kg/ha, łącznie z N min. (forma amonowa lub amidowa + przedplon, przy zastosowaniu nawadniania zaleca się stosować dzielenie na dwie dawki: 1/4 przed sadzeniem i 3/4 pogłównie, krótko przed zawiązywaniem bulw. Przy oczekiwanym plonie 60+ nawożenie dzielić na dwie dawki w proporcjach 2/3 : 1/3. Bez nawadniania skuteczniejsze jest stosowanie amidowej formy azotu),
- P_2O_5 100 kg/ha,
- K_2O 280-300 kg, (dopuszczalne jest zastosowanie formy chlorkowej maksymalnie do dawki 80 kg/ha). Przy nawadnianiu dzielić nawożenie na 2 dawki: 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Należy unikać stanowisk z dużą skłonnością do powstawania rdzawej plamistości bulw,
- Sadzeniaki powinny być fizjologicznie dojrzałe, stosować pobudzanie bulw,
- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Odmiana jest średnio wrażliwa na metrybuzynę stosowaną przed-, jak i powschodowo (przy stosowaniu powschodowym, zaleca się dzielić oprysk na 2 dawki, po 200 g, drugi zabieg po 4-5 dniach),
- Po zawiązaniu bulw oraz 7-10 dni po kwitnieniu zaleca się 1 lub 2 zabiegi dolistne fosforem,
- BELLAROSA jest wrażliwa na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw.

