

EUROPLANT

Bernina

średnio wczesna
odmiana sałatkowa

- intensywnie żółty kolor miąższu
- bulwy ładne, podłużno-owalne
- wysoki plon handlowy

✓ **BARDZO DŁUGIE PRZECHOWY-WANIE**

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193, +48 94 347 34 61


Bernina

- Odmiana średnio wczesna (130-135 dni wegetacji), bardzo plenna, lekko sałatkowa – typ AB,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	15-17 cm	13-14 cm
	35/55	26-28 cm	22-24 cm
+60	28/35	18-20 cm	15-16 cm
	35/55	32-34 cm	25-27 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: SADZIĆ 3 CM GŁĘBIEJ



Nawożenie

- N 100-120 kg/ha, łącznie z N min. (przy nawadnianiu zaleca się podzielenie azotu na 2 dawki: 2/3 przed sadzeniem i 1/3 pogłównie). Opcja alternatywna: 25 kg przed sadzeniem, 60 kg krótko przed wschodami, a reszta dolistnie po 5–6 kg N/ha,
- P_2O_5 100 kg/ha,
- K_2O 300-270 kg/ha (jako K_2SO_4) – odmiana tolerancyjna na suszę, jednak przy nawadnianiu stosować nawożenie potasem w dwóch dawkach 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- W celu zwiększenia ilości zawiązywanych bulw stosować pobudzanie oraz obłamywanie kłów apikalnych,
- Po wschodach BERNINA wykazuje średnią wrażliwość na metrybuzynę, dlatego nie powinno się środków opartych na tej substancji stosować powschodowo (jeżeli jednak zajdzie taka konieczność należy podzielić dawkę, stosując jednorazowo maks. 200 g środka i po 4-5 dniach zabieg powtórzyć),
- BERNINA ma mniejsze o ok. 20 % zapotrzebowanie na azot w porównaniu do innych odmian z tego segmentu,
- Odmiana jest wrażliwa na zarazę ziemniaka, zarówno liści, jak i bulw, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw,
- Zaleca się terminowy zbiór po pełnym wykształceniu (skorkowaceniu) skórki, co gwarantuje zachowanie wysokiej jakości bulw.

