WIEMY CO **SADZIĆ**!

EUROPLANT



Eurostarch

średnio późna odmiana skrobiowa

- dobrze znosi okresy suszy
- nadaje się na słabsze stanowiska
- biały kolor miąższu bulw
- średnia zawartość skrobi 19-21 %

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193, +48 94 347 34 61


Eurostarch

- Odmiana średnio późna, **skrobiowa** (135-140 dni wegetacji)
- Odmiana bardzo plenna o wysokiej zawartości skrobi, bardzo tolerancyjna na suszę i słabsze stanowiska, bardzo odporna na wirusy i o wysokiej odporności na zarazę ziemniaka i parcha zwykłego
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania
- jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20-25 cm

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów		Obsada roślin/ha
		75 cm	90 cm	
35/55	28/35	18-20 cm	15-17 cm	66-74.000
	35/55	32-34 cm	27-28 cm	39-42.000

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie

- N 140-160 kg/ha, łącznie z $N_{min.}$ (w formie amonowej lub amidowej), przy nawadnianiu zaleca się dzielenie dawki na 2/3 przed sadzeniem i 1/3 pogłównie,
- P_2O_5 100 kg/ha (warto zastosować 30-40% z zalecanej dawki pogłównie – zwiększa to liczbę bulw, ich dojrzałość i zawartość skrobi),
- K_2O 190-250 kg/ha (jako K_2SO_4, możliwe do 80 kg/ha w formie chlorkowej, przy nawadnianiu zaleca się dzielenie dawki w proporcjach: 2/3 – przed sadzeniem i 1/3 – przed zwarciem rzędów),
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi (dla plonu 50 t/ha)

- Stosować pobudzanie bulw 4-5 dni przed sadzeniem, aby uzyskać max. 3-4 mm silne kiełki,
- Zaleca się zaprawianie bulw, z preferencją aplikowania zaprawy w trakcie sadzenia bezpośrednio do redlin. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- EUROSTARCH nie jest wrażliwa na metrybuzynę zarówno stosowaną przed-, jak i powschodowo,
- Na wczesne nawożenie dolistne zalecany jest wieloskładnikowy preparat mikroelementowy,
- Po kwitnieniu wskazane jest azotowe nawożenie dolistne (max. 6-7 kg N/zabieg),
- Ze względu na późną dojrzałość zaleca się wczesne i systematyczne stosowanie wyspecjalizowanych substancji aktywnych przeciwko alternariozie (piraklostrobina + boskalid lub azoksystrobina).

