WIEMY CO SADZIĆ!

EUROPLANT



Euroviva

późna odmiana skrobiowa

- bardzo wysoki plon skrobi z ha
- biały miąższ
- średnia zawartość skrobi 18-22 %

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193, +48 94 347 34 61


Euroviva

- Odmiana późna, **skrobiowa** (140-145 dni wegetacji),
- Odmiana bardzo plenna o wysokiej zawartości skrobi, odporna na wirusy, preferuje gleby średnie do dobrych,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20-25 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów		Obsada roślin/ha
		75 cm	90 cm	
+35	28/35	20-22 cm	17-18 cm	61-67.000
	35/55	36-39 cm	30-33 cm	34-37.000

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie

- N 150-170 kg/ha, łącznie z $N_{min.}$ (w formie amonowej lub amidowej), przy nawadnianiu zaleca się dzielenie dawki na 2/3 przed sadzeniem i 1/3 pogłównie,
- P_2O_5 100 kg/ha (warto zastosować 30-40% z zalecanej dawki pogłównie – zwiększa to liczbę bulw, ich dojrzałość i zawartość skrobi),
- K_2O 190-250 kg/ha (jako K_2SO_4, przy nawadnianiu dobre korzyści przynosi dzielenie dawki w proporcjach: 2/3 – przed sadzeniem i 1/3 – przed zwarciem rzędów),
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi (dla plonu 50 t/ha)

- Stosować pobudzanie bulw 5-7 dni przed sadzeniem, aby uzyskać max. 3-4 mm silne kiełki,
- Zaleca się zaprawianie bulw, z preferencją aplikowania zaprawy w trakcie sadzenia bezpośrednio do redlin. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- EUROVIVA nie jest wrażliwa na metrybuzynę przy stosowaniu zarówno przed-, jak i powschodowym,
- Po kwitnieniu wskazane jest 1-2-krotne dolistne nawożenie azotowe (max. 6-7 kg N/ha zabieg),
- Ze względu na późną dojrzałość zaleca się wczesne i systematyczne stosowanie wyspecjalizowanych substancji aktywnych przeciwko alternariozie (piraklostrobina + boskalid lub azoksystrobina).

