

EUROPLANT

Larissa

średnio wczesna odmiana, ogólnoużytkowa

- wysoki plon handlowy
- gładka skórka
- optycznie ładny wygląd bulw
- żołty i smaczny miąższ
- dobry spoczynek kiełków
- nadaje się do dłuższego przechowywania

✓ IDEALNA DO PAKOWA-NIA

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193, +48 94 347 34 61


Larissa

- Odmiana średnio wczesna (125-135 dni wegetacji),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	15-17 cm	14-15 cm
	35/55	27-29 cm	23-24 cm
+60	28/35	20-22 cm	17-18 cm
	35/55	32 -34cm	27-28 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 110-130 kg/ha w formie amonowej/amidowej, łącznie z N min., (przy nawadnianiu zaleca się podzielenie azotu na 2 dawki w stosunku: 1/3 przed sadzeniem i 2/3 krótko przed lub w czasie zawiązywania bulw). Bez nawadniania dobre wyniki daje zastosowanie stabilizującej formy nawozu azotowego. Alternatywnie: 30 kg/ha przed sadzeniem, 60 kg/ha N przed wschodami, resztę po 5-6 kg/ha N dolistnie po kwitnieniu (można łączyć z innymi zabiegami ochrony roślin),
- P_2O_5 90 kg/ha,
- K_2O 350-300 kg/ha (najlepiej w formie K_2SO_4), przy nawadnianiu stosować nawożenie potasem w dwóch dawkach 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Przed sadzeniem stosować pobudzanie bulw: podnieść temperaturę bulw do 15^0 C, czas 1-2 tygodnie w zależności od dojrzałości fizjologicznej bulw,
- Zapotrzebowanie na azot jest niższe w porównaniu do innych odmian w tym segmencie,
- Krótko po kwitnieniu zaleca się 1-2 opryski dolistnie nawozami P K,
- Desykacja powinna odbywać się w sposób stopniowy,
- LARISSA wykazuje lekką wrażliwość na mechaniczne uszkodzenia, dlatego należy zwrócić uwagę na delikatny zbiór dojrzałych bulw, w temperaturze poniżej 22 stopni Celsjusza,
- Odmiana niewrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo.

