

EUROPLANT

Monique

wczesna odmiana sałatkowa

- żółty miąższ
- ładne, kształtne bulwy
- gładka, jasna skórka

SEGMENT PREMIUM

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193, +48 94 347 34 61


Monique

- Odmiana wczesna (115-125 dni wegetacji),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości sadzeniaków należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	16-18 cm	13-15 cm
	35/55	30-32 cm	24-26 cm
+60	28/35	20 cm	17 cm
	35/55	34 cm	28 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 140-160 kg/ha łącznie z N. min (przy nawadnianiu zaleca się dzielenie azotu na 2 dawki: 2/3 przed sadzeniem i 1/3 pogłównie),
- P_2O_5 100 kg/ha,
- K_2O 270-300 kg/ha (w formie K_2SO_4),
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Należy unikać obłamywania kiełków,
- Zaleca się zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Po kwitnieniu należy podawać po 5–6 kg azotu (N) dolistnie przy każdym zabiegu przeciwko zarazie ziemniaka,
- MONIQUE nie wykazuje wrażliwości na metrybuzynę, stosowaną zarówno przed, jak i po wschodach,
- Z uwagi na dużą wrażliwość liści na zarazę ziemniaka, zalecana jest systematyczna ochrona przed tą chorobą, dlatego dla lepszej ochrony należy stosować fungicydy z różnych grup chemicznych (różnorodne substancje czynne), aż do momentu zbioru bulw,
- Desykacja (niszczenie naci) nie powinna przebiegać gwałtownie, należy stosować mniejsze dawki podzielone na 2-3 zabiegi.

