

EUROPLANT

Montana

średnio wczesna odmiana sałatkowa

- żółty miąższ
- wyrównany plon handlowy
- długotrwałe przechowywanie

✓ **IDEALNA NA DŁUGIE PRZECHOWANIE**

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193, +48 94 347 34 61


Montana

- Odmiana średnio wczesna (130-135 dni wegetacji), w typie AB - sałatkowym, przydatna do długotrwałego przechowywania, o ładnej gładkiej skórce i płytkich oczkach,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	30-32 cm	24-25 cm
+60	28/35	20-22 cm	17-18 cm
	35/55	34 -36cm	27-29 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 120-130 kg/ha, łącznie z N min. (preferowana forma amonowa lub mocznikowa, przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 1/3 przed sadzeniem i 2/3 pogłównie),
- K_2O 250-280 kg/ha (jako K_2SO_4) – przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie),
- P_2O_5 100 kg/ha,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Preferuje lepsze stanowiska z równomiernym zaopatrzeniem w wodę i składniki pokarmowe, jednak na słabszych glebach plonuje nadal bardzo wysoko,
- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Należy unikać obłamywania kiełków tuż przed sadzeniem, wskazane pobudzenie bulw (3-4 dni przed sadzeniem),
- MONTANA jest średnio wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo, dlatego należy jej unikać na tym etapie (w razie stosowania zaleca się dzielenie zabiegu na dwie dawki maksymalnie po 200 g w odstępstwie 5 dni),
- Odmiana wykazuje lekką wrażliwość na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw.

