WIEMY CO SADZIĆ!

EUROPLANT



Red Sonia

bardzo wczesna odmiana ogólnoużytkowa

NAJSMACZNIEJSZA

- wczesny czas dojrzewania
- czerwona, gładka skórka
- wyrównane bulwy z płytkimi oczkami
- żółty, smaczny miąższ

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193, +48 94 347 34 61


Red Sonia

- Odmiana bardzo wczesna (80-95 dni wegetacji), w typie kulinarnym B (ogólnoużytkowy),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Sadzenie w dobrze ogrzaną, suchą i spulchnioną na głębokość minimum 20 cm glebę.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	16-18 cm	13-15 cm
	35/55	30-32 cm	25-27 cm
+60	28/35	19-20 cm	16-17 cm
	35/55	33 -35 cm	28-29 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 160-170 kg/ha, łącznie z N min. (w formie saletry amonowej),
- P_2O_5 90 kg/ha,
- K_2O 270-300 kg/ha, jako K_2SO_4 (do 100 kg/ha możliwe w dawce w postaci chlorkowej),
- MgO 60 kg/ha.

Uwagi

- RED SONIA wymaga lepszych stanowisk, z odpowiednio zapewnioną wilgotnością,
- Sadzeniaki należy przed sadzeniem pobudzić, aby przyśpieszyć wschody i wzrost roślin,
- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- RED SONIA jest średnio wrażliwa na metrybuzynę, stosowaną przedwschodowo, jednak wrażliwa na stosowaną powschodowo, dlatego należy unikać jej stosowania po wschodach,
- Odmiana jest wrażliwa na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw,
- Zaleca się wykonać 2 zabiegi dolistnego dokarmiania roślin fosforem i potasem po kwitnieniu,
- Zbiór wykonywać przy pełnej dojrzałości bulw (w trakcie pocierania palcem skórka nie łuszczy się).

