

Ricarda

średnio wczesna odmiana jadalna w typie B, o czerwonej skórce

BIAŁY MIĄŻSZ

- kremowobiały miąższ
- bardzo ładny kształt bulw
- wysoki plon handlowy

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193, +48 94 347 34 61


Ricarda

- Odmiana średnio wczesna (120-130 dni wegetacji), w typie kulinarnym B (ogólnoużytkowy),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	15-17 cm	14-15 cm
	35/55	18-20 cm	23-24 cm
+60	28/35	20-22 cm	16-17 cm
	35/55	33 -34 cm	27-28 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 150-170 kg/ha, łącznie z N min., w formie amonowej lub amidowej, zapotrzebowanie na azot jest większe w porównaniu do innych odmian, przy nawadnianiu dawki azotu należy dzielić: 2/3 i 1/3,
- K_2O 270-350 kg/ha (do ½ dawki przed sadzeniem można stosować formę chlorkową), przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie,
- P_2O_5 100 kg/ha,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Należy unikać stanowisk mocno sprzyjających powstawaniu rdzawej plamistości bulw,
- 3-4 dni przed sadzeniem zastosować pobudzanie bulw w wyższej temperaturze,
- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- RICARDA wykazuje średnią wrażliwość na metrybuzynę stosowaną przedwschodowo, powschodowo nie powinno się jej stosować w ogóle – jest bardzo wrażliwa,
- Odmiana jest średnio wrażliwa na mechaniczne uszkodzenia, przez co należy zwrócić uwagę aby zbioru dokonywać przy pełnej dojrzałości skórki (przy pocieraniu palcem skórka na bulwie nie łuszczy się).

