**WIEMY** CO **SADZIĆ**!

EUROPLANT



# Zuzanna

**odmiana wczesna do średnio wczesnej**

- odpowiednia na słabsze gleby
- jasnożółty miąższ
- średnia zawartość skrobi 18-20 %

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193, +48 94 347 34 61


# Zuzanna

- Odmiana średnio wczesna, **skrobiowa** (130-135 dni wegetacji),
- Odmiana plenna o wysokiej zawartości skrobi, odporna na wirusy, dość odporna na parcha zwykłego, średnio odporna na zarazę ziemniaka, możliwość uprawy na każdej glebie, tolerancyjna na okresowe braki wody i gorsze stanowiska,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20-25 cm.

**GĘSTOŚĆ SADZENIA:**

| Oczekiwana frakcja handlowa | Kalibraż sadzeniaków | Rozstaw rzędów | | Obsada roślin/ha |
|---|---|---|---|---|
| | | 75 cm | 90 cm | |
| +35 | 28/35 | 18-20 cm | 15-17 cm | 66-74.000 |
| | 35/55 | 32-34 cm | 27-28 cm | 39-42.000 |

**GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA**




## Nawożenie

- N 150-160 kg/ha, łącznie z $N_{min.}$ (w formie amonowej lub amidowej), przy nawadnianiu zaleca się dzielenie dawki na 2/3 przed sadzeniem i 1/3 pogłównie,
- $P_2O_5$ 100 kg/ha (warto zastosować 30-40% z zalecanej dawki pogłównie – zwiększa to liczbę bulw, ich dojrzałość i zawartość skrobi),
- $K_2O$ 190-250 kg/ha (jako $K_2SO_4$, do 80 kg/ha może być w formie KCl, na glebach lżejszych i przy nawadnianiu dobre korzyści przynosi dzielenie dawki w proporcjach: 2/3 przed sadzeniem i 1/3 przed zwarciem rzędów),
- MgO 70 kg/ha.

## Uwagi (dla plonu 50 t/ha)

- Stosować pobudzanie bulw 4-5 dni przed sadzeniem, aby uzyskać max. 5 mm silne kiełki,
- Zaleca się zaprawianie bulw, z preferencją aplikowania zaprawy w trakcie sadzenia bezpośrednio do redlin. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- ZUZANNA nie jest wrażliwa na metrybuzynę przy stosowaniu zarówno przed-, jak i powschodowym,
- Po zawiązaniu bulw wskazane jest dolistne nawożenie azotowe (max. 6-7 kg N/ha),
- Zaleca się wczesne i systematyczne stosowanie wyspecjalizowanych substancji aktywnych przeciwko alternariozie (piraklostrobina + boskalid lub azoksystrobina).

