WIEMY CO **SADZIĆ**!

EUROPLANT



Donata

- średnio wczesna odmiana frytkowa o doskonałych parametrach przetwórczych,
- jasnożółty kolor miąższu,
- wysoki plon handlowy,
- idealna na długotrwałe przechowywanie.

IDEALNA ODMIANA FRYTKOWA

www.europlant.biz, @: epp@europlant.biz, tel: +48 734 474 193


Donata

- Donata jest odmianą średnio późną (135-140 dni wegetacji)
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm
- Gruby kalibraż, podłużno-owalne bulwy i wysoki plon wymagają odpowiednio wysokich redlin

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
	75 cm	90 cm
28/35	23 cm	19 cm
35/50	36 cm	30 cm
50/55	40 cm	33 cm
35/55	38 cm	32 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: 3 CM GŁĘBIEJ



- Nie jest wrażliwa na metrybuzynę.
- Zapotrzebowanie DONATY na azot zależne jest od rodzaju gleby, stanowiska i oczekiwanego kalibrażu
- P_2O_5 100 kg/ha,
- K_2O 350-380 kg/ha (K_2SO_4)
- MgO 80 kg/ha.
- Po zbiorach należy zwrócić uwagę na odpowiednie osuszenie bulw i zagojenie ran.
- Przechowywać w stałej temperaturze (7 °C).

Uwagi (dla zakładanego plonu 50t/ha)

- Unikać stanowisk ze skłonnością do sprzyjania rozwojowi rdzawej plamistości.
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż tydzień po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości, należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet (zalecana temp. składowania 5°C).
- 3 tygodnie przed sadzeniem zaleca się wybranie bulw z chłodni. Fizjologicznie dojrzały materiał zwiększa liczbę zawiązywanych bulw.
- Celem pobudzenia ziemniaków, na tydzień przed sadzeniem, podnieść temperaturę bulw do 15°C.
- Głębokość sadzenia: 3 cm głębiej.
- Dopuszcza się zaprawianie bulw, jednak przy kiełkujących bulwach lub z obłamanymi kiełkami należy zaprawiać glebę (azoksystrobina dobrze chroni przed wieloma patogenami grzybowymi).
- Zalecana jest systematyczna ochrona przed zarazą ziemniaka, dla lepszej ochrony należy stosować fungicydy z różnych grup chemicznych (różnorodne substancje czynne), również chroniące bulwy.
- Zaleca się wczesną ochronę przeciwko Alternaria ssp.
- Dawki azotu: 2/3 przed sadzeniem 1/3 w czasie wiązania bulw dają dobre efekty.
- Dodatkowo zaleca się po kwitnieniu 2-3 x N- oprysk dolistny (w ilości 6 kg/ha).
- DONATA jest lekko wrażliwa na mechaniczne uszkodzenia bulw, dlatego należy zwrócić uwagę na łagodny zbiór dojrzałych bulw.
- Przechowywanie do grudnia w temperaturze 8°C, dłużej w temperaturze 7°C.

