EUROPLANT

ODMIANY

2026 | 2027

30 lat razem

WIEMY
CO **SADZIĆ**!

www.europlant.biz

EUROPLANT

SPIS ODMIAN

Albertine	10
Anuschka	12
Belana	14
Bernina	16
Bellarosa	18
Catania	20
Corinna	22
Filipa	24
Jelly	26
Larissa	28
Marabel	30
Monique	32
Montana	34
Otolia EKO	36
Red Sonia	38
Vineta	40

Jeśli sadzisz materiał z własnego zbioru odmian chronionych, musisz uiścić opłatę dla hodowcy za odstępstwo rolne.

WIEMY CO SADZIĆ

EUROPLANT

EUROPLANT to innowacyjna, działająca na skalę międzynarodową firma handlowa w sektorze ziemniaków sadzeniaków. Jako koncern zajmujący się komercjalizacją sadzeniaków odmian powiązanych z nami hodowli, posiadamy niezbędny know–how hodowlany i działamy w ponad 70 krajach na całym świecie.

NASZA WIZJA – hodujemy, by nakarmić świat i chronić naszą planetę.
NASZA MISJA – pracujemy na rzecz nowoczesnego, wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

W branży ziemniaczanej, jesteśmy postrzegani jako rzetelny i uczciwy partner biznesowy. Nasz sukces opiera się na trzech filarach – odmiany, kompetencje, serwis.

ODMIANY EUROPLANT – różnorodność i jakość:
Nasze odmiany są hodowane klasycznie przy użyciu konwencjonalnych technik hodowlanych, bez używania genetycznie modyfikowanego materiału nasiennego. Od wielu lat udoskonalanie naturalnej odporności i zwiększanie wydajności upraw są priorytetem naszych prac rozwojowych nad odmianami. Nasz asortyment obejmuje ponad 100 rodzajów odmian jadalnych, przetwórczych i skrobiowych. Każda z naszych odmian jest unikalną kombinacją odpowiednich parametrów, zapewniających doskonałą jakość, która potrafi sprostać różnorodnym oczekiwaniom naszych klientów.

PROFESJONALIZM EUROPLANT
–know-how i kompetencje:

Wysoka jakość naszych sadzeniaków, to wynik stosowania zintegrowanego systemu produkcji.

Od hodowli in vitro oraz produkcji mini–bulw i sadzeniaków przedbazowych w naszych gospodarstwach nasiennych, po dużą liczbę doświadczonych rolników kontraktowych, kontrolujemy jakość naszej produkcji.

Nasi doradcy dzielą się wiedzą i kompleksowo wspierają plantatorów, tak, by zagwarantować pomyślną produkcję ziemniaków i dobrać idealne narzędzia marketingowe. Ze względu na posiadanie własnych zakładów produkcji sadzeniaków, rozumiemy potrzeby naszych plantatorów i rolników, którzy zawsze mogą polegać na wiedzy naszych doświadczonych ekspertów.

Jednym z ważnych aspektów naszego profesjonalizmu jest produkcja sadzeniaków dla rolnictwa ekologicznego. Również w tym sektorze oferujemy szeroką gamę odpornych i doskonałych odmian gwarantujących najwyższą jakość.

SERWIS EUROPLANT
– wspieramy i dzielimy się wiedzą

Pomagamy naszym klientom, oferując rzetelne doradztwo agrotechniczne. Od wyboru odmian po zbiory, przechowywanie i marketing – nasi eksperci zapewniają cenne wsparcie. Liczne wizyty polowe u naszych klientów stanowią podstawę rekomendacji odmianowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Kupując sadzeniaki zwiększasz potencjał własnego gospodarstwa

To już ponad 30 lat *razem!*

Trzy dekady temu, zaczynając od zaledwie 2 hektarów upraw w Laskach Koszalińskich, postawiliśmy na jakość i relacje oparte na zaufaniu. Dziś z wielką satysfakcją świętujemy jubileusz 30-lecia jako lider produkcji nasiennej w Polsce, którym niezmiennie pozostajemy od ponad dekady. Nasze odmiany, z legendarną Vinetą na czele, zyskały uznanie rolników, zapewniając nam obecnie 18% udziału w krajowym rynku. W tym okresie sukcesywnie rozwijaliśmy nasiennictwo naszych odmian osiągając ponad 1400 ha plantacji nasiennych w Polsce. Nieustannie gwarantujemy najwyższą jakość sadzeniaków z naszej produkcji oraz zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie technologii uprawy ziemniaków. Aktywnie towarzyszymy intensywnym zmianom na rynku jakościowego ziemniaka jadalnego. Wspólnie z rolnikami wyznaczamy kierunki rozwoju poszczególnych sektorów produkcji ziemniaka, szukając najlepszych rozwiązań w zakresie doboru odmian i agrotechniki, by sprostać wymaganiom rynku i konsumentów. To dzięki naszym partnerom w biznesie, nieustannie się uczymy i rozwijamy. Bo miarą naszego sukcesu jest zaufanie i zadowolenie naszych klientów.

Nieustannie **WIEMY CO SADZIĆ!**

EUROPLANT

TYPY KULINARNE (KONSUMPCYJNE)

Typ kulinarny to określenie przydatności odmiany na różne cele kulinarne (potrawy) z uwagi na zwięzłość miąższu. Ziemniaki są pyszne i bardzo je lubimy, dlatego poznanie cech odmiany i jej typu kulinarnego pozwala najlepiej dobrać odpowiednie ziemniaki do naszych ulubionych potraw.

Typ **A** sałatkowy:

miąższ po ugotowaniu pozostaje zwięzły, dający się łatwo pokroić w plastry, kostkę, ósemki. Ziemniaki typu **A** doskonale nadają się na sałatki, smażone ziemniaki i do zup. Kostka lub plaster zostaje w całości po ugotowaniu lub smażeniu.

Typ **B** ogólnoużytkowy:

miąższ po ugotowaniu jest dość zwarty, ale pod widelcem lekko się rozgniata. Ziemniaki tego typu spożywamy najczęściej jako gotowane do obiadu w towarzystwie mięs i sosów.

Typ **C** mączysty:

miąższ po ugotowaniu jest rozsypujący się i wyraźnie mączysty. Ziemniaki tego typu nadają się na placki, puree, frytki.

Typ **D** bardzo mączysty

Pomiędzy tymi typami występują również typy pośrednie np AB, BC czy BBC łączące oba typy lub mające tendencje bardziej do typu B lub C.

BARDZO WCZESNE JADALNE	typ kulinarny	kolor miąższu	kształt bulwy	% skrobi
Albertine	B	żółty	ow	11,5
Anuschka	AB	żółty	oow	12,0
Catania	B	kremowy	ow-pow	12,0
Corinna	B	żółty	ow	12,0
Filipa	B	żółty	ow	12,0
WCZESNE JADALNE	**typ kulinarny**	**kolor miąższu**	**kształt bulwy**	**% skrobi**
Larissa	B	żółty	ow	13,0
Belana	B	żółty	oow	12,5
Marabel	B	żółty	ow	13,0
Monique	A	żółty	pow	12,5
Bellarosa	B	żółty	oow czerw. sk.	12,7
Otolia **EKO**	B	żółty	ow	13,0
Vineta	AB-B	żółty	oow	12,7
ŚREDNIO WCZESNE JADALNE	**typ kulinarny**	**kolor miąższu**	**kształt bulwy**	**% skrobi**
Madeira	B	j. żółty	ow	13,0
Montana	AB	żółty	ow	13,0
Bernina	A	żółty	pow	12,0
ŚREDNIO PÓŹNE DO PÓŹNYCH JADALNE	**typ kulinarny**	**kolor miąższu**	**kształt bulwy**	**% skrobi**
Jelly	B-BC	żółty	oow	14,8

Wszystkie nasze odmiany jadalne charakteryzuje brak ciemnienia miąższu surowego i gotowanego.

EUROPLANT

Albertine

ogólnoużytkowa (typ B),
bardzo wczesna odmiana jadalna

- optycznie ładny wygląd bulw
- szybko dojrzewająca
- gładka skórka
- wysoki plon handlowy

NAJWCZE-
ŚNIEJSZA

Albertine

- Odmiana bardzo wczesna (80-85 dni wegetacji),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	32-34 cm	26-27 cm
+60	28/35	20-21 cm	16-17 cm
	35/55	35-36 cm	27-28 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie

- N 140-150 kg/ha, łącznie z N min. (w zależności od rodzaju gleby, regionu, kalibrażu),
- P_2O_5 80 kg/ha,
- K_2O 200-220 kg/ha (jako K_2SO_4),
- MgO 60 kg/ha.

Uwagi

- Należy unikać stanowisk sprzyjających rozwojowi parcha ziemniaka,
- Stosować pobudzanie bulw, unikać obłamywania kiełków,
- Stwierdzono średnią wrażliwość na metrybuzynę: przed-, jak i powschodową,
- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- ALBERTINE wykazuje lekką wrażliwość na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych,
- W czasie dojrzewania, w razie konieczności stosować tylko niewielkie dawki deszczowania.



EUROPLANT

Anuschka

bardzo wczesna, do wczesnej
jadalna odmiana sałatkowa, typ AB

WCZESNA

- żółty miąższ
- wysoka jakość typu sałatkowego
- odpowiedni kształt bulw
- gładka skórka, płytkie oczka
- bardzo wysoki plon handlowy
- bardzo odporna na wtórny wzrost bulw

Anuschka

- Odmiana bardzo wczesna do wczesnej (85-95 dni wegetacji),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18 cm	14 cm
	35/55	32-33 cm	26-27 cm
+60	28/35	20 cm	16 cm
	35/55	34-36 cm	27-28 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 130-140 kg/ha łącznie z N min., (forma amonowa lub amidowa w zależności od rodzaju gleby, regionu, kalibrażu),
- P_2O_5 90 kg/ha,
- K_2O 220-250 kg/ha, (jako K_2SO_4),
- MgO 60 kg/ha.

Uwagi

- Należy unikać stanowisk sprzyjających występowaniu rdzawej plamistości bulw,
- Stosować pobudzanie bulw, należy **bezwzględnie unikać** obłamywania kiełków,
- Temperatura ziemi podczas sadzenia powinna wynosić ≥ 8 stopni Celsjusza,
- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- ANUSCHKA wykazuje lekką wrażliwość na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych,
- Odmiana jest lekko wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne – zbiór oraz dalsze sortowanie i pakowanie należy przeprowadzać z zachowaniem ostrożności,
- Zastosowanie odpornych międzyplonów w celu zwalczania nicieni (np. rzodkiew oleista) wywołuje efekt biofumigacji. Poprzez wymieszanie rozdrobnionych roślin z glebą wydzielają się izotiocyjaniany, które skutecznie zwalczają szkodniki odglebowe.

EUROPLANT

Belana

wczesna odmiana sałatkowa, segment premium, bardzo długie przechowywanie

- odmiana sałatkowa, typ AB
- żółty miąższ
- wysoka jakość kulinarna po ugotowaniu
- wysoki plon towarowy

IDEALNA NA DŁUGIE PRZECHOWA-NIE

Belana

- Odmiana wczesna (120- 125 dni wegetacji), w typie A (sałatkowa), z bardzo długim okresem przechowywania,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-20 cm	14-16 cm
	35/55	32-34 cm	25-27 cm
+60	28/35	20-22 cm	16-18 cm
	35/55	34-36 cm	27-29 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie

- N 140-160 kg/ha, w formie amonowej lub amidowej łącznie z N min. (w zależności od rodzaju gleby, regionu, kalibrażu, zaleca się podzielenie azotu na 2 dawki w stosunku: 2/3:1/3). Zaleca się wykonanie dwóch zabiegów dolistnego nawożenia azotem,
- P_2O_5 100 kg/ha,
- K_2O 280-300 kg/ha (jako K_2SO_4, do 100 kg można zastosować w formie KCl), przy nawadnianiu stosować nawożenie potasem w dwóch dawkach 2/3:1/3,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi (dla plonu 50 t/ha)

- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi (w przypadku BELANY nie przekraczać dawki 250 g sub. czynnej),
- Należy unikać stanowisk sprzyjających rozwojowi rdzawej plamistości bulw,
- Stosować pobudzanie bulw, sadzić w ogrzaną glebę, wzorcowe pobudzanie: kiełki wielkości główki od szpilki. Unikać obłamywania kiełków,
- Nie jest wrażliwa na metrybuzynę, również stosowaną powschodowo,
- BELANA jest lekko wrażliwa na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych.



EUROPLANT

Bernina

średnio wczesna odmiana sałatkowa

- intensywnie żółty kolor miąższu
- bulwy ładne, podłużno-owalne
- wysoki plon handlowy

BARDZO DŁUGIE PRZECHOWY-WANIE

Bernina

- Odmiana średnio wczesna (130-135 dni wegetacji), bardzo plenna, lekko sałatkowa – typ AB,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	15-17 cm	13-14 cm
	35/55	26-28 cm	22-24 cm
+60	28/35	18-20 cm	15-16 cm
	35/55	32-34 cm	25-27 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: SADZIĆ 3 CM GŁĘBIEJ



Nawożenie

- N 100-120 kg/ha, łącznie z N min. (przy nawadnianiu zaleca się podzielenie azotu na 2 dawki: 2/3 przed sadzeniem i 1/3 pogłównie). Opcja alternatywna: 25 kg przed sadzeniem, 60 kg krótko przed wschodami, a reszta dolistnie po 5–6 kg N/ha,
- P_2O_5 100 kg/ha,
- K_2O 300-270 kg/ha (jako K_2SO_4) – odmiana tolerancyjna na suszę, jednak przy nawadnianiu stosować nawożenie potasem w dwóch dawkach 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- W celu zwiększenia ilości zawiązywanych bulw stosować pobudzanie oraz obłamywanie kłów apikalnych,
- Po wschodach BERNINA wykazuje średnią wrażliwość na metrybuzynę, dlatego nie powinno się środków opartych na tej substancji stosować powschodowo (jeżeli jednak zajdzie taka konieczność należy podzielić dawkę, stosując jednorazowo maks. 200 g środka i po 4-5 dniach zabieg powtórzyć),
- BERNINA ma mniejsze o ok. 20 % zapotrzebowanie na azot w porównaniu do innych odmian z tego segmentu,
- Odmiana jest wrażliwa na zarazę ziemniaka, zarówno liści, jak i bulw, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw,
- Zaleca się terminowy zbiór po pełnym wykształceniu (skorkowaceniu) skórki, co gwarantuje zachowanie wysokiej jakości bulw.



WIEMY CO SADZIĆ!

EUROPLANT

Bellarosa

wczesna odmiana jadalna, typ B

- czerwona skórka
- bardzo dobra trwałość przechowalnicza
- wyjątkowy smak
- córka odmiany Vineta
- bardzo duże bulwy

WYSOKI PLON

Bellarosa

- BELLAROSA odmiana bardzo wczesna (75-80 dni wegetacji), typ B – ogólnoużytkowy,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Wymagania glebowe: niskie do średnich,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	13-15 cm	11-13 cm
	35/55	22-24 cm	18-20 cm
+60	28/35	16-18 cm	13-15 cm
	35/55	28-30 cm	23-25 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 110-120 kg/ha, łącznie z N min. (forma amonowa lub amidowa + przedplon, przy zastosowaniu nawadniania zaleca się stosować dzielenie na dwie dawki: 1/4 przed sadzeniem i 3/4 pogłównie, krótko przed zawiązywaniem bulw. Przy oczekiwanym plonie 60+ nawożenie dzielić na dwie dawki w proporcjach 2/3 : 1/3. Bez nawadniania skuteczniejsze jest stosowanie amidowej formy azotu),
- K_2O 280-300 kg, (dopuszczalne jest zastosowanie formy chlorkowej maksymalnie do dawki 80 kg/ha). Przy nawadnianiu dzielić nawożenie na 2 dawki: 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie,
- P_2O_5 100 kg/ha,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Należy unikać stanowisk z dużą skłonnością do powstawania rdzawej plamistości bulw,
- Sadzeniaki powinny być fizjologicznie dojrzałe, stosować pobudzanie bulw,
- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Odmiana jest średnio wrażliwa na metrybuzynę stosowaną przed-, jak i powschodowo (przy stosowaniu powschodowym, zaleca się dzielić oprysk na 2 dawki, po 200 g, drugi zabieg po 4-5 dniach),
- Po zawiązaniu bulw oraz 7-10 dni po kwitnieniu zaleca się 1 lub 2 zabiegi dolistne fosforem,
- BELLAROSA jest wrażliwa na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw.



EUROPLANT

Catania

wczesna jadalna odmiana, typ B

- kremowobiały miąższ
- gładka skórka z płytkimi oczkami
- wysoki plon, bulwy owalne skłonne do dużych
- brak skłonności do rdzawej plamistości miąższu

BIAŁY MIĄŻSZ

Catania

- Odmiana bardzo wczesna (95-115 dni wegetacji), w typie B (ogólnoużytkowym),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	32-34 cm	26-27 cm
+60	28/35	20-21 cm	16-17 cm
	35/55	35-36 cm	27-28 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 140-160 kg/ha, łącznie z N min. (korzystna jest forma azotanowa), przy nawadnianiu zaleca się dzielenie dawki na 2/3 i 1/3,
- P_2O_5 90 kg/ha,
- K_2O 240-300 kg/ha (jako K_2SO_4), przy nawadnianiu zaleca się dzielenie dawki na 2/3 i 1/3,
- MgO 60 kg/ha.

Uwagi

- Nadaje się szczególnie na średnie do lepszych stanowisk. Należy unikać stanowisk sprzyjających powstawaniu parcha ziemniaka,
- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby,
- Podkiełkowywanie albo pobudzanie bulw umożliwiają szybszy wzrost i wcześniejszy zbiór. Należy unikać obłamywania kiełków,
- Nie jest wrażliwa na metrybuzynę, bulwy są odporne na rdzawą plamistość miąższu,
- W razie potrzeby i możliwości korzystnym jest zabieg nawadniania, przed zawiązywaniem się bulw,
- Po kwitnieniu, ewentualnie 7-10 dni później wskazane jest nawożenie dolistne (maks. 6 kg N/oprysk),
- CATANIA jest wrażliwa na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych do końca wegetacji.



EUROPLANT

Corinna

bardzo wczesna odmiana ogólnoużytkowa

- ładne kształtne bulwy
- szybko dojrzewająca, gładka skórka
- wyrównany kalibraż
- wielokrotnie nagradzana za walory smakowe
- nadaje się do pakowania

NAJSMACZNIEJSZA

Corinna

- Odmiana bardzo wczesna (85-100 dni wegetacji), w typie B (ogólnoużytkowy),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	32-34 cm	26-27 cm
+60	28/35	20-21 cm	16-17 cm
	35/55	35-36 cm	29-30 cm

NORMALNA GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA:



Nawożenie

- N 140-160 kg/ha (forma azotanowa), łącznie z N min. (w zależności od rodzaju gleby, regionu, kalibrażu),
- P_2O_5 80 kg/ha,
- K_2O 250-220 kg/ha (jako K_2SO_4).
- MgO 60 kg/ha, (forma azotanowa),

Uwagi (dla plonu 50 t/ha)

- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Należy unikać stanowisk sprzyjających rozwojowi parcha ziemniaka,
- Stosować pobudzanie bulw, unikać obłamywania kiełków,
- CORINNA wykazuje średnią wrażliwość na metrybuzynę, dlatego należy unikać stosowania jej po wschodach,
- Zaleca się dolistne nawożenie borem, pierwszy zabieg 7 dni po kwitnieniu, kolejny po następnych 7 dniach,ww
- CORINNA jest średnio wrażliwa na zarazę ziemniaka, zarówno liści, jak i bulw, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw,
- **Po osiągnięciu dojrzałości skórki (skorkowaceniu) należy przeprowadzić desykację roślin i odpowiednio wczesny zbiór.**



EUROPLANT

Filipa

ogólnoużytkowa (typ B),
bardzo wczesna odmiana jadalna

- optycznie ładny wygląd bulw
- gładka skórka
- okrągłoowalny kształt bulw
- szybko dojrzewająca
- wczesny, wysoki plon

NAJWCZE-
ŚNIEJSZA

Filipa

- Odmiana bardzo wczesna (80-85 dni wegetacji),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	32-34 cm	26-27 cm
+60	28/35	20-21 cm	16-17 cm
	35/55	35-36 cm	27-28 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie

- N 140-160 kg/ha, łącznie z N.min, zastosować nawóz o wysokiej zawartości formy azotanowej (w zależności od rodzaju gleby, regionu, kalibrażu),
- P_2O_5 80 kg/ha,
- K_2O 270-220 kg/ha (jako K_2SO_4),
- MgO 60 kg/ha.

Uwagi

- Należy unikać stanowisk z dużą skłonnością do powstawania rdzawej plamistości bulw,
- Do czasu planowanego sadzenia materiał nasienny należy utrzymywać w niskiej temperaturze,
- Stwierdzono średnią wrażliwość na metrybuzynę: przed-, jak i powschodową,
- Jeżeli sadzeniaki nie były wcześniej podkiełkowywane, krótko przed sadzeniem zaleca się ich odpowiednie pobudzenie, unikać obłamywania kieków. Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystne jest również zaprawienie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Filipa wykazuje lekką wrażliwość na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych.

WIEMY CO SADZIĆ!

EUROPLANT

Jelly

średnio późna odmiana jadalna, typ B-BC

- wyjątkowy smak
- kształtne bulwy
  – nadaje się do pakowania
- bardzo wysoki plon – pow. 50 t/ha
- żółty miąższ

WYSOKI PLON

Jelly

- Odmiana średnio późna (135-140 dni wegetacji), typ B-BC, bardzo plenna,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	32-34 cm	27-28 cm
+60	28/35	20-21 cm	17-18 cm
	35/55	35-36 cm	29-30 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 120-130 kg/ha, łącznie z N min. (przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 2/3 przed sadzeniem i 1/3 pogłównie),
- K_2O 300-350 kg/ha (przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie),
- P_2O_5 100 kg/ha,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Warto pobudzać bulwy na kilka dni przed sadzeniem (bardziej wyrównane wschody),
- Sadzić tylko w ciepłą, ogrzaną glebę, minimalna temp. gleby na 10 cm – 10°C,
- Zaleca się zaprawianie bulw, z preferencją aplikowania zaprawy w trakcie sadzenia bezpośrednio do redlin. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Odmiana niewrażliwa na metrybuzynę stosowaną przedwschodowo, jednak średnio wrażliwa przy stosowaniu powschodowym,
- Nie stosować preparatów zawierających chlomazon,
- JELLY jest wrażliwa na alternarię, zaleca się wczesną i systematyczną ochronę fungicydową.



EUROPLANT

Larissa

średnio wczesna odmiana, ogólnoużytkowa

- wysoki plon handlowy
- gładka skórka
- optycznie ładny wygląd bulw
- żołty i smaczny miąższ
- dobry spoczynek kiełków
- nadaje się do dłuższego przechowywania

IDEALNA DO PAKOWANIA

Larissa

- Odmiana średnio wczesna (125-135 dni wegetacji),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	15-17 cm	14-15 cm
	35/55	27-29 cm	23-24 cm
+60	28/35	20-22 cm	17-18 cm
	35/55	32 -34cm	27-28 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 110-130 kg/ha w formie amonowej/amidowej, łącznie z N min., (przy nawadnianiu zaleca się podzielenie azotu na 2 dawki w stosunku: 1/3 przed sadzeniem i 2/3 krótko przed lub w czasie zawiązywania bulw). Bez nawadniania dobre wyniki daje zastosowanie stabilizującej formy nawozu azotowego. Alternatywnie: 30 kg/ha przed sadzeniem, 60 kg/ha N przed wschodami, resztę po 5-6 kg/ha N dolistnie po kwitnieniu (można łączyć z innymi zabiegami ochrony roślin),
- P_2O_5 90 kg/ha,
- K_2O 350-300 kg/ha (najlepiej w formie K_2SO_4), przy nawadnianiu stosować nawożenie potasem w dwóch dawkach 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Przed sadzeniem stosować pobudzanie bulw: podnieść temperaturę bulw do 15^0 C, czas 1-2 tygodnie w zależności od dojrzałości fizjologicznej bulw,
- Zapotrzebowanie na azot jest niższe w porównaniu do innych odmian w tym segmencie,
- Krótko po kwitnieniu zaleca się 1-2 opryski dolistnie nawozami P K,
- Desykacja powinna odbywać się w sposób stopniowy,
- LARISSA wykazuje lekką wrażliwość na mechaniczne uszkodzenia, dlatego należy zwrócić uwagę na delikatny zbiór dojrzałych bulw, w temperaturze poniżej 22 stopni Celsjusza,
- Odmiana niewrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo.



EUROPLANT

Marabel

bardzo plenna,
wczesna odmiana jadalna,
typ konsumpcyjny B

- żółty miąższ
- optycznie ładny kształt bulw
- wyjątkowy smak
- idealna do pakowania

IDEALNA DO PAKOWANIA

Marabel

- Odmiana wczesna (115-120 dni wegetacji),
- Prosta w uprawie, w warunkach krótkotrwałej suszy i wysokich temperatur daje wysokie i stabilne plony,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	30-32 cm	24-25 cm
+60	28/35	20-22 cm	17-18 cm
	35/55	34-36 cm	27-29 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie

- P_2O_5 100 kg/ha,
- MgO 70 kg/ha,
- N 140-160 kg/ha, łącznie z N min., w formie amonowej/amidowej (w zależności od rodzaju gleby, regionu, kalibrażu) - rozdzielone w dwóch dawkach 2/3 : 1/3,
- K_2O 280-300 kg/ha (jako K_2SO_4; do 140 kg można w formie KCL), przy nawadnianiu w dwóch dawkach 2/3 : 1/3.

Uwagi (dla plonu 50 t/ha)

- Należy unikać stanowisk mocno sprzyjających powstawaniu rdzawej plamistości,
- Preferuje lepsze stanowiska zasobne w wilgoć i składniki pokarmowe,
- Generalnie zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby,
- Należy unikać sadzenia ziemniaków w zmianowaniu na danym polu, nie częściej niż co 4 lata,
- Marabel jest wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo, należy jej unikać w stosowaniu, (jeżeli to konieczne, to w dwóch dawkach, z maks. 200 g sub. czynnej i powtórką po 4-5 dniach).



EUROPLANT

Monique

wczesna odmiana sałatkowa

- żółty miąższ
- ładne, kształtne bulwy
- gładka, jasna skórka

SEGMENT PREMIUM

Monique

- Odmiana wczesna (115-125 dni wegetacji),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości sadzeniaków należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	16-18 cm	13-15 cm
	35/55	30-32 cm	24-26 cm
+60	28/35	20 cm	17 cm
	35/55	34 cm	28 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 140-160 kg/ha łącznie z N. min (przy nawadnianiu zaleca się dzielenie azotu na 2 dawki: 2/3 przed sadzeniem i 1/3 pogłównie),
- P_2O_5 100 kg/ha,
- K_2O 270-300 kg/ha (w formie K_2SO_4),
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Należy unikać obłamywania kiełków,
- Zaleca się zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Po kwitnieniu należy podawać po 5–6 kg azotu (N) dolistnie przy każdym zabiegu przeciwko zarazie ziemniaka,
- MONIQUE nie wykazuje wrażliwości na metrybuzynę, stosowaną zarówno przed, jak i po wschodach,
- Z uwagi na dużą wrażliwość liści na zarazę ziemniaka, zalecana jest systematyczna ochrona przed tą chorobą, dlatego dla lepszej ochrony należy stosować fungicydy z różnych grup chemicznych (różnorodne substancje czynne), aż do momentu zbioru bulw,
- Desykacja (niszczenie naci) nie powinna przebiegać gwałtownie, należy stosować mniejsze dawki podzielone na 2-3 zabiegi.

EUROPLANT

Montana

średnio wczesna odmiana sałatkowa

- żółty miąższ
- wyrównany plon handlowy
- długotrwałe przechowywanie

IDEALNA NA DŁUGIE PRZECHOWANIE

Montana

- Odmiana średnio wczesna (130-135 dni wegetacji), w typie AB - sałatkowym, przydatna do długotrwałego przechowywania, o ładnej gładkiej skórce i płytkich oczkach,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	18-19 cm	15-16 cm
	35/55	30-32 cm	24-25 cm
+60	28/35	20-22 cm	17-18 cm
	35/55	34 -36cm	27-29 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 120-130 kg/ha, łącznie z N min. (preferowana forma amonowa lub mocznikowa, przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 1/3 przed sadzeniem i 2/3 pogłównie),
- K_2O 250-280 kg/ha (jako K_2SO_4) – przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie),
- P_2O_5 100 kg/ha,
- MgO 70 kg/ha.

Uwagi

- Preferuje lepsze stanowiska z równomiernym zaopatrzeniem w wodę i składniki pokarmowe, jednak na słabszych glebach plonuje nadal bardzo wysoko,
- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Należy unikać obłamywania kiełków tuż przed sadzeniem, wskazane pobudzenie bulw (3-4 dni przed sadzeniem),
- MONTANA jest średnio wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo, dlatego należy jej unikać na tym etapie (w razie stosowania zaleca się dzielenie zabiegu na dwie dawki maksymalnie po 200 g w odstępstwie 5 dni),
- Odmiana wykazuje lekką wrażliwość na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw.



EUROPLANT

Otolia

ogólnoużytkowa (typ B),
średnio wczesna odmiana jadalna

- żółty miąższ
- owalny, ładny wygląd bulw
- wyrównany kalibraż i plon handlowy
- sprawdzona w ekologicznym systemie uprawy

EKO

Otolia

- Odmiana średnio wczesna (135-140 dni wegetacji), w typie kulinarnym B, **dedykowana do produkcji ekologicznej z uwagi na wysokie odporności na wirusy i zarazę ziemniaka**,
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	16-18 cm	13-15 cm
	35/55	28-30 cm	23-25 cm
+60	28/35	20 cm	17 cm
	35/55	32-34 cm	27-28 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 110-130 kg/ha w formie amonowej/amidowej, łącznie z N min.., (przy nawadnianiu zaleca się podzielenie azotu na 2 dawki w stosunku: 1/3 przed sadzeniem i 2/3 krótko przed lub w czasie zawiązywania bulw. Bez nawadniania dobre wyniki daje zastosowanie stabilizującej formy nawozu azotowego. Alternatywnie: 30 kg/ha przed sadzeniem, 70 kg/ha N przed wschodami, resztę po 5-6 kg/ha N dolistnie po kwitnieniu (można łączyć z innymi zabiegami ochrony roślin),
- P_2O_5 80 kg/ha,
- K_2O 300-270 kg/ha (jako K_2SO_4), przy nawadnianiu zaleca się dzielić na dwie dawki: 1/2 przed sadzeniem i 1/2 pogłównie,
- MgO 60 kg/ha.

Uwagi

- Uprawa odpowiednich międzyplonów (rzodkiew oleista) = efekt biofumigacji = wprowadzenie do gleby drobno posiekanych roślin z rodziny kapustnych, powoduje powstawanie izotiocyjanianów, które są bardzo skuteczne w zwalczaniu szkodliwych patogenów glebowych,
- Sadzić przy temperaturze gleby > 8 stopni Celsjusza
- Generalnie zaleca się chemiczne zaprawianie bulw, korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- Odmiana niewrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo,
- Odmiana wrażliwa na alternariozę. Zaleca się wczesny start z zabiegami fungicydowymi,
- Nie formować zbyt wysokich rzędów przed wschodami,
- OTOLIA wykazuje lekką wrażliwość na mechaniczne uszkodzenia, dlatego należy zwrócić uwagę na delikatny zbiór dojrzałych bulw.



WIEMY CO SADZIĆ!

EUROPLANT

Red Sonia

bardzo wczesna odmiana ogólnoużytkowa

NAJSMACZNIEJSZA

- wczesny czas dojrzewania
- czerwona, gładka skórka
- wyrównane bulwy z płytkimi oczkami
- żółty, smaczny miąższ

Red Sonia

- Odmiana bardzo wczesna (80-95 dni wegetacji), w typie kulinarnym B (ogólnoużytkowy),
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet,
- Sadzenie w dobrze ogrzaną, suchą i spulchnioną na głębokość minimum 20 cm glebę.

GĘSTOŚĆ SADZENIA:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Rozstaw rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	16-18 cm	13-15 cm
	35/55	30-32 cm	25-27 cm
+60	28/35	19-20 cm	16-17 cm
	35/55	33 -35 cm	28-29 cm

GŁĘBOKOŚĆ SADZENIA: NORMALNA



Nawożenie (dla plonu 50 t/ha)

- N 160-170 kg/ha, łącznie z N min. (w formie saletry amonowej),
- P_2O_5 90 kg/ha,
- K_2O 270-300 kg/ha, jako K_2SO_4 (do 100 kg/ha możliwe w dawce w postaci chlorkowej),
- MgO 60 kg/ha.

Uwagi

- RED SONIA wymaga lepszych stanowisk, z odpowiednio zapewnioną wilgotnością,
- Sadzeniaki należy przed sadzeniem pobudzić, aby przyśpieszyć wschody i wzrost roślin,
- Zaleca się zaprawianie bulw. Korzystnym jest również zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi,
- RED SONIA jest średnio wrażliwa na metrybuzynę, stosowaną przedwschodowo, jednak wrażliwa na stosowaną powschodowo, dlatego należy unikać jej stosowania po wschodach,
- Odmiana jest wrażliwa na zarazę ziemniaka, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw,
- Zaleca się wykonać 2 zabiegi dolistnego dokarmiania roślin fosforem i potasem po kwitnieniu,
- Zbiór wykonywać przy pełnej dojrzałości bulw (w trakcie pocierania palcem skórka nie łuszczy się).



WIEMY
CO SADZIĆ

EUROPLANT



Vineta

wczesna odmiana jadalna

- bardzo dobry smak,
- wysoka jakość kulinarna,
- odporna na suszę,
- nadaje się na gleby lekkie,
- miąższ surowy oraz po ugotowaniu,
- nie ciemnieje.

Vineta

ABSOLUTNY nr 1 W POLSCE

Wczesna odmiana jadalna, o bardzo dobrej jakości odżywczej i jasno żółtym miąższu.

Wymagania glebowe: Vineta wymaga gleb średnich jak i średniego zapotrzebowania na wodę. Nadaje się również do uprawy na gleby lekkie, ale utrzymane w dobrej kulturze rolnej. Odporna jest na stres związany z suszą.

Wymagania szczególne: Vinetę należy sadzić w rozstawie rzędów 75 cm, co 28-30 cm. Jest bardzo wdzięczna za harmonijne nawożenie: **N** – 160 kg/ha, **K** – 200 do 250 kg/ha, **P** – 100 kg/ha lub pełna dawka obornika 350 q/ha pod głęboką orkę zimowa (obornik koniecznie jesienią). Uwzględnić należy również nawożenie mikroelementami. Vineta wrażliwa na metrybuzynę stosowaną powschodowo. Jest średnio podatna na zarazę ziemniaczaną i alternariozę, jednak dla zapewnienia wysokich plonów i dobrego przechowywania bulw zaleca się standardowy program oprysków fungicydami. W celu wyrównania wschodów i ochrony przed rizoktoniozą, zaleca się zaprawianie sadzeniaków. Zbiór należy wykonać w temp. pow. 12 st. C, co pozwala ograniczyć uszkodzenia bulw, a następnie przez 2-4 tyg. zaleca się wentylowanie i schłodzenie w celu wysuszenia i zabliźnienia uszkodzeń.

Vineta jest bardzo spokojna pod względem kiełkowania, dlatego zachowuje bardzo dobrą jakość konsumpcyjną do późnej wiosny. Wyrównane plony powyżej 400 q/ha. Wysoki udział frakcji handlowej 95%.

Wczesność	wczesna	**Bulwy** Kształt Głębokość oczek Barwa miąższu Skórka	 okrągłoowalny płytkie - średnio płytkie jasnożółta szorstka
Walory kulinarne	typ kulinarny AB-B ogólnoużytkowy, wyjątkowo smaczna, zawartość skrobi 12,7%, miąższ może lekko rozsypywać się po ugotowaniu	**Odporność** Nicienie Wirusy	Mątwik ziemniaka Ro 1 średnia do dużej
Wschody	wczesne		
Przechowywanie	długi okres spoczynku	**Podatność** Parch Rdzawa plamistość Czarna plamistość Uszkodzenia Czarna nóżka	 mała bardzo mała średnia mała mała

Nasze odmiany chronione są wyłącznym prawem hodowcy.

Użycie ich ponownie do sadzenia z własnego materiału, nakłada obowiązek opłaty za odstępstwo rolne na rzecz hodowcy.

Kontakt

Biuro:

Elżbieta Łysiak
Kierownik Biura Sprzedaży

Tel. +48 734 474 193
Mail Elzbieta.Lysiak@europlant.biz

Dorota Michałowska
Asystentka
działu nasiennictwa

Mob. +48 605 308 088
Mail Dorota.Michalowska(at)europlant.biz

Katarzyna Bednarczyk
Księgowa

Tel. +48 728 480 043
Mail Katarzyna.Bednarczyk@europlant.biz

Doradcy klienta:

Katarzyna Zdziechowicz
odmiany chipsowe

Tel. +48 660 568 901
Mail Katarzyna.Zdziechowicz@europlant.biz

Krzysztof Martyna
odmiany skrobiowe

Tel. +48 664 476 782
Mail Krzysztof.Martyna@europlant.biz

Michał Pulut
odmiany jadalne

Tel. +48 728 480 011
Mail Michal.Pulut@europlant.biz

Dyrekcja:

Dr hab. Sławomir Wróbel
Dyrektor
ds. nasiennictwa i produkcji

Tel. +48 602 606 233
Mail Slawomir.Wrobel@europlant.biz

Jarosław Stawiszyński
Dyrektor
ds. handlowych

Tel. +48 668 431 117
Mail Jaroslaw.Stawiszynski@europlant.biz

EUROPLANT Polska Sp. z o.o.
Laski Koszalińskie 3a
76-039 Biesiekierz
e-mail: epp@europlant.biz
tel.: 94 347 34 61

www.europlant.biz

Znajdź nas i polub na Facebooku

foto: Marcin Golik/kreatywnie.org
Archiwum Europlant