


**Vineta** überzeugt durch ihre Robustheit, frühe Knollenentwicklung und gute Trockenresistenz.

Anbauempfehlung:		mehr Info	
<b>Standortansprüche</b>	stellt geringe bis mittlere Ansprüche an Boden und Feuchtigkeit. Sie erzielt auch unter schwierigen Bedingungen (z. B. Trockenstress) stabil Erträge in ansprechender Qualität.		
<b>Pflanzung</b>	35/50	Legeabstand (75-cm Reihe) von 28-30 cm (~47.000 - 44.000 Pflanzen/ha)	
	Pflanztiefe	Standard	
	Vorbereitung	Standard	
	Beizung	Beizung gegen Rhizoctonia empfohlen	
<b>Herbizide</b>	im Voraufbau besteht keine Empfindlichkeit gegenüber Metribuzin-haltigen Herbiziden. Im Nachaufbau reagiert Vineta in schwierigen Situationen empfindlich auf den den Metribuzineinsatz		
<b>Blattgesundheit</b>	Standard		
<b>Düngung</b>		incl. Rücklieferung Vorfrucht	
<b>Stickstoff</b>	160 kg/ha incl. N <sub>min</sub> incl. org. Düng.	auf auswaschungsgefährdeten Standorten Gaben über 80 kg N/ha splitten	
<b>Phosphor</b>	100 kg/ha	wasserlösliches Phosphat zum Pflanzen	
<b>Kalium</b>	200 - 250 kg/ha	sulfatischer Kalium	
<b>Magnesium</b>	60 kg /ha	zur Ertrags- und Qualitätssicherung	
<b>Blattdüngung</b>	keine pauschale Empfehlung, auf Mangelstandorten ergänzend		
<b>Sorteneigenschaften</b>			
<b>Reife</b>	früh	<b>Knolle</b>	oval mittel -flach gelb genetzt
<b>Speisewert</b>	vorwiegend fest- kochend mit leicht mehligem Charakter	Form Augenlage Fleischfarbe Schale	
<b>Ertrag</b>	mittlere Erträge bei grobfällender Sortierung	<b>Resistenzen</b>	Ro 1
<b>Jugend</b>	früh deckend	Nematoden	
<b>Lagerung</b>	keimruhig, Einkellerungssorte	<b>Anfälligkeiten</b>	gering gering bis mittel mittel gering bis mittel
		Schorf Eisenfleckigkeit Schwarzfleckigkeit Beschädigung	

Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für die Angaben übernommen werden.