


## BERNINA

- BERNINA odmiana średnio wczesna (90-120 dni wegetacji)
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm
- Gęstość sadzenia:

Fracja	Kalibraż	Odległość rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	15-17 cm	13-14 cm
	35/55	27-30 cm	22-24 cm
+60	28/35	18-20 cm	15-16 cm
	35/55	32-34 cm	25-27 cm

Głębokość sadzenia: sadzić 3 cm głębiej



- $P_2O_5$  80-100 kg/ha,
- MgO 60 kg/ha,
- generalnie zaleca się zaprawianie bulw, korzystniejszym jest zaprawianie gleby (preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi)

### UWAGI

- stosować pobudzanie bulw,
- po wschodach BERNINA wykazuje lekką wrażliwość na metrybuzynę, dlatego nie powinno się środków opartych na tej substancji aktywnej stosować powschodowo (jeżeli jednak zajdzie taka konieczność należy podzielić dawkę, stosując jednorazowo maks. 200 g środka i po 4-5 dniach zabieg powtórzyć)
- BERNINA ma mniejsze o ok. 20 % zapotrzebowanie na azot w porównaniu do innych odmian z tego segmentu
- N 120-140 kg/ha, łącznie z  $N_{min}$ . (w zależności od rodzaju gleby, regionu, kalibrażu, zaleca się podzielenie azotu na 2 dawki)
- $K_2O$  -280-300 kg/ha (jako  $K_2SO_4$ ) tolerancyjna na suszę - przy nawadnianiu stosować nawożenie potasem w dwóch dawkach 50:50
- BERNINA jest wrażliwa na zarazę ziemniaka, zarówno na liści, jak i bulw, dlatego zaleca się systematyczne i regularne stosowanie preparatów grzybobójczych aż do momentu zbioru bulw.

