


MONIQUE

- MONIQUE odmiana wczesna (115-125 dni wegetacji)
- Jeżeli sadzenie przewidziane jest później niż miesiąc po dostawie sadzeniaków, w celu utrzymania jakości sadzeniaków należy wysypać bulwy z big bagów do skrzyniopalet
- Uprawa gleby: gleba powinna być dobrze uprawiona i spulchniona na głębokość minimum 20 cm
- Gęstość sadzenia:

Oczekiwana frakcja handlowa	Kalibraż sadzeniaków	Odległość rzędów	
		75 cm	90 cm
40/60	28/35	16-18 cm	13-15 cm
	35/55	30-32 cm	24-26 cm
60+	28/35	20 cm	17 cm
	35/55	34 cm	28 cm

Głębokość sadzenia: normalna




NAWÓŻENIE (dla plonu 50 t/ha)

- MONIQUE ma mniejsze o 20% w porównaniu z podobnymi odmianami tego segmentu zapotrzebowanie na azot (120-130 kg/ha, łącznie z N_{min})
- P_2O_5 90 kg/ha
- K_2O minimum 270-300 kg/ha (w formie K_2SO_4)
- MgO 60 kg/ha

UWAGI

- Należy unikać obłamywania kielków
- Zaleca się zaprawianie gleby – preparaty zawierające azoksystrobinę dobrze chronią bulwy przed wieloma chorobami grzybowymi
- MONIQUE nie wykazuje wrażliwości na metrybuzynę, stosowaną zarówno przed, jak i po wschodach
- Z uwagi na dużą wrażliwość liści na zarazę ziemniaka, zalecana jest systematyczna ochrona przed tą chorobą, dlatego dla lepszej ochrony należy stosować fungicydy z różnych grup chemicznych (różnorodnie substancje czynne), aż do momentu zbioru bulw
- Desykacja (niszczenie naci) nie powinna przebiegać gwałtownie, należy stosować mniejsze dawki podzielone na 2-3 zabiegi.



1/1 N
1/1 P_2O_5
1/1 K_2O
przed
sadzeniem

Desykacja
– 1. zabieg

Desykacja 2. i
3. zabieg

Wczesny start z ochroną przeciwko zarazie ziemniaka