Menarini Patate srl

# COLUMBIA



## patata da consumo medio-precoce, prevalentemente soda

- colore della polpa giallo
- forma del tubero rotondeggiante
- pezzatura sostenuta
- alta resa commerciabile

# COLUMBIA

COLUMBIA - alta resa commerciabile

| **Raccomandazioni di coltivazione** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Requisiti del campo** | predilige condizioni di terreno medio-buone, con un apporto uniforme di acqua e sostanze nutritive | | | |
| **Semina** | **Dimensione del seme 35/50** | **Distanza tra le file** | | **Tuberi/ha** |
| | | **75 cm** | **90 cm** | |
| | | 30-32 cm | 25-27 cm | 43.000 |
| | | per i tuberi più grandi +2 cm | | |
| | **Profondità di semina** | standard | | |
| | **Preparazione del seme** | ha una buona dormienza; è sensibile alla rottura dei germogli; è utile uno shock termico breve prima della semina (3-4 giorni) | | |
| | **Trattamento del seme** | trattamento contro Rhizoctonia solani raccomandata | | |
| **Erbicidi** | non si conoscono sensibilità se usato correttamente* | | | |
| **Fogliame** | media tenuta alle malattie fogliari; si consiglia l'uso tempestivo e regolare di fungicidi contro la peronospora tardiva | | | |
| **Raccolta** | garantire un raccolto delicato | | | |
| **Fertilizzazione** incl. ritorno della coltura precedente | | | | |
| **Azoto (N)** | medio - rispetto allo standard locale (2/3 prima della semina e 1/3 successivamente) | | | |
| **Fosforo (P2O5)** | 100 kg/ha (fosfato solubile in acqua alla semina) | | | |
| **Potassio (K2O)** | 350-270 kg/ha (possibile fino a 80 kg/ha di cloruro; su terreni più leggeri dosi frazionate) | | | |
| **Magnesio (MgO)** | 70 kg/ha (per il controllo della resa e della qualità) | | | |
| **Caratteristiche** | | | | |
| **Maturità** | medio-precoce | **Tubero** | | |
| **Tipo di cottura** | B | Forma | | tondo-ovale |
| | | Posizione degli occhi | | medio - basso |
| | | Colore della polpa | | giallo |
| | | Colore della pelle | | giallo |
| | | Pelle | | liscio |
| | | Numero di tuberi | | medio - alto |
| **Qualità del consumo** | cottura prevalentemente soda, bassa decolorazione dopo la cottura, buon sapore | **Resistenze** | | |
| | | Nematodi cisticoli | | Ro1 (7) |
| | | Rogna nera | | 1 (a) |
| **Rendimento** | calibro di grandi dimensioni con un'elevata resa commerciabile | **Sensibilità** | | |
| | | Scabbia comune | | basso |
| | | Anulatura | | molto basso - basso |
| **Sviluppo della vegetazione** | rapido | Ammaccatura | | basso |
| | | Danni meccanici | | basso - medio |
| **Consevabilità** | buona dormienza | | | |

* preliminare | (a) bassa sensibilità
Tutti i dati si basano su prove ufficiali di varietà e/o sulla nostra esperienza. Tuttavia, poiché le patate sono prodotti naturali, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per questi dettagli. (02/2025)

Menarini Patate Srl | Via San Donato 191 | 40057 Granarolo Dell' Emilia (Bologna) |
Tel. +39 (0)51 6056883 | Fax +39 (0)51 6056640 | info@menarinipatate.it | www.menarinipatate.it