



patata da consumo tardiva, prevalentemente soda

- ✓ colore della polpa giallo
- ✓ tuberi attraenti dalla forma stabile
- ✓ resa commerciabile molto elevata
- ✓ perfetta adattabilità a tutte le condizioni climatiche

JELLY - combina rese di mercato molto elevate, dimensioni uniformi da medie a grandi; buona tolleranza alla siccità e resistenza alle malattie secondarie

Raccomandazioni di coltivazione					
Requisiti del campo		nessun requisito particolare in termini di terreno e nutrizione			
Semina 	Dimensione del seme 35/50	Distanza tra le file		Tuberi/ha	
		75 cm	90 cm		
		28-30 cm		23-25 cm	46.000
		per tuberi di grandi dimensioni +4 cm			
	Profondità di semina	standard			
	Preparazione del seme	ha una buona dormienza; stimolare la germinazione in modo uniforme prima della semina (7-10 giorni)			
Trattamento del seme	trattamento contro Rhizoctonia solani raccomandata				
Erbicidi	mostra una sensibilità media al Metribuzin in post-emergenza				
Fogliame	media tenuta alle malattie fogliari; si consiglia l'uso tempestivo e regolare di fungicidi contro la peronospora tardiva				
Raccolta	garantire un raccolto delicato				
Fertilizzazioneincl. ritorno della coltura precedente					
Azoto (N)	medio - rispetto allo standard locale (2/3 prima della semina e 1/3 successivamente)				
Fosforo (P2O5)	100 kg/ha (fosfato solubile in acqua alla semina)				
Potassio (K2O)	350-270 kg/ha (possibile fino a 80 kg/ha di cloruro; su terreni più leggeri dosi frazionate)				
Magnesio (MgO)	70 kg/ha (per il controllo della resa e della qualità)				
Caratteristiche					
Maturità	medio tardivo	Tubero	Forma Posizione degli occhi Colore della polpa Colore della pelle Pelle Numero di tuberi ovale superficiale giallo giallo liscio - retinato medio		
Tipo di cottura	B				
Qualità del consumo	ottima qualità alla cottura, bassa decolorazione, idoneità alla frittura	Resistenze	Nematodi cisticoli Rogna nera Ro1 (9), Ro2/3 (9), Ro4, Ro5 1, 2 (a), 6 (a)		
Rendimento	resa commerciabile molta elevata, tuberi di dimensioni medio-grandi, calibro molto uniforme	Sensibilità	Scabbia comune Anulatura Ammaccatura Danni meccanici basso basso basso basso - medio		
Sviluppo della vegetazione	rapido				
Consevasibilità	buona dormienza				

(a) bassa sensibilità

Tutti i dati si basano su prove ufficiali di varietà e/o sulla nostra esperienza. Tuttavia, poiché le patate sono prodotti naturali, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per questi dettagli. (05/2026)