Menarini Patate srl

# LAURA



## patata da consumo a ciclo intermedio, buccia rossa con cottura prevalentemente soda

- colore della polpa giallo intenso
- tubero di forma ovale,uniforme con occhi poco profondi
- sapore eccellente
- buona conservabilità

www.menarinipatate.it

# LAURA

LAURA - la “regina della buccia rossa” con polpa di colore giallo intenso e alta qualità culinaria

| **Raccomandazioni di coltivazione** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Requisiti del campo** | predilige condizioni di terreno medio-buone, con un apporto uniforme di acqua e sostanze nutritive | | | |
| **Semina** | **Dimensione del seme 35/50** | **Distanza tra le file** | | **Tuberi/ha** |
| | | **75 cm** | **90 cm** | |
| | | 28-30 cm | 23-25 cm | 46.000 |
| | **Profondità di semina** | standard | | |
| | **Preparazione del seme** | ha una buona dormienza; è sensibile alla rottura dei germogli; è utile uno shock termico breve prima della semina (3-4 giorni) | | |
| | **Trattamento del seme** | chiedere consiglio; può essere sensibile a singoli principi attivi | | |
| **Erbicidi** | è sensibile al Metribuzin in pre- e post-emergenza; evitare l'uso | | | |
| **Fogliame** | media tenuta alle malattie fogliari; è necessario l'uso tempestivo e regolare di fungicidi contro la peronospora tardiva | | | |
| **Raccolta** | per raggiungere la stabilità della pelle è necessaria circa una settimana in più; varietà da conservazione classica, deve essere completamente asciutto prima del lavaggio | | | |
| **Fertilizzazione** incl. ritorno della coltura precedente | | | | |
| **Azoto (N)** | medio - rispetto allo standard locale (2/3 prima della semina e 1/3 successivamente) | | | |
| **Fosforo (P2O5)** | 100 kg/ha (fosfato solubile in acqua alla semina) | | | |
| **Potassio (K2O)** | 350-270 kg/ha (possibile fino a 150 kg/ha di cloruro; su terreni più leggeri dosi frazionate) | | | |
| **Magnesio (MgO)** | 70 kg/ha (per il controllo della resa e della qualità) | | | |
| **Caratteristiche** | | | | |
| **Maturità** | medio-precoce | **Tubero** | | |
| **Tipo di cottura** | B | Forma | ovale | |
| **Qualità del consumo** | cottura prevalentemente soda; sapore eccellente | Posizione degli occhi | superficiale | |
| | | Colore della polpa | giallo intenso | |
| | | Colore della pelle | rosso | |
| | | Pelle | liscio | |
| | | Numero di tuberi | medio | |
| **Rendimento** | resa medio alta, con uniforme resa commerciabile | **Resistenze** | | |
| | | Nematodi cisticoli | Ro1, Ro2/3, Ro4, Ro5 | |
| | | Rogna nera | 1 (a) | |
| **Sviluppo della vegetazione** | rapido | **Sensibilità** | | |
| **Consevabilità** | buona dormienza | Scabbia comune | basso - medio | |
| | | Anulatura | basso - medio | |
| | | Ammaccatura | basso | |
| | | Danni meccanici | medio | |

(a) bassa sensibilità

Tutti i dati si basano su prove ufficiali di varietà e/o sulla nostra esperienza. Tuttavia, poiché le patate sono prodotti naturali, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per questi dettagli. (02/2025)

Menarini Patate Srl | Via San Donato 191 | 40057 Granarolo Dell' Emilia (Bologna) |
Tel. +39 (0)51 6056883 | Fax +39 (0)51 6056640 | info@menarinipatate.it | www.menarinipatate.it