Menarini Patate srl

# SARATOGA RUSSET



## varietà medio tardiva per patatine fritte

- colore della polpa bianco crema
- forma di tubero ovale e lungo
- ad alto rendimento
- qualità di cottura stabile

# SARATOGA RUSSET

SARATOGA RUSSET - varietà con produzione di tuberi di grandi dimensioni

| **Raccomandazioni di coltivazione** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Requisiti del campo** | predilige terreni medi con un apporto uniforme di acqua e sostanze nutritive | | | |
| **Semina** | **Dimensione del seme 35/55** | **Distanza tra le file** | | **Tuberi/ha** |
| | | **75 cm** | **90 cm** | |
| | | 34-36 cm | 27-28 cm | 38.000 |
| | **Profondità di semina** | piantate 2 cm più profondo in zone con elevate rese (max. 17 cm di copertura del suolo) | | |
| | **Preparazione del seme** | ha una buona dormienza; stimolare la germinazione in modo uniforme prima della semina (7-10 giorni) | | |
| | **Trattamento del seme** | trattamento contro Rhizoctonia solani raccomandata | | |
| **Erbicidi** | non si conoscono sensibilità se usato correttamente | | | |
| **Fogliame** | media tenuta alle malattie fogliari ; si raccomanda l'uso tempestivo e regolare di fungicidi anche contro l'Alternaria | | | |
| **Raccolta** | garantire un raccolto delicato | | | |
| **Fertilizzazione** incl. ritorno della coltura precedente | | | | |
| **Azoto (N)** | elevato - rispetto allo standard locale (2/3 prima della semina e 1/3 successivamente) | | | |
| **Fosforo (P2O5)** | 100 kg/ha (fosfato solubile in acqua alla semina) | | | |
| **Potassio (K2O)** | 250-190 kg/ha (possibile fino a 80 kg/ha di cloruro; su terreni più leggeri dosi frazionate) | | | |
| **Magnesio (MgO)** | 70 kg/ha (per il controllo della resa e della qualità) | | | |
| **Caratteristiche** | | | | |
| **Maturità** | medio tardivo - tardivo | **Tubero** | | |
| **Tipo di cottura** | C | Forma | lungo-ovale | |
| | | Posizione degli occhi | superficiale | |
| | | Colore della polpa | bianco - giallo chiaro | |
| | | Colore della pelle | giallo | |
| | | Pelle | liscio - retinato | |
| | | Numero di tuberi | medio | |
| **Qualità della lavorazione** | buona qualità di cottura con elevata resa del prodotto, temperatura di conservazione > 7 °C | **Resistenze** | | |
| | | Nematodi cisticoli | Ro1 (9) | |
| **Rendimento** | alta resa, elevata uniformità | **Sensibilità** | | |
| **Sviluppo della vegetazione** | inizialmente lento, poi rapido | Scabbia comune | basso | |
| | | Anulatura | molto basso - basso | |
| **Consevabilità** | buona dormienza | Ammaccatura | molto basso - basso | |
| | | Danni meccanici | medio - alto | |

Tutti i dati si basano su prove ufficiali di varietà e/o sulla nostra esperienza. Tuttavia, poiché le patate sono prodotti naturali, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per questi dettagli. (02/2025)

Menarini Patate Srl | Via San Donato 191 | 40057 Granarolo Dell' Emilia (Bologna) |
Tel. +39 (0)51 6056883 | Fax +39 (0)51 6056640 | info@menarinipatate.it | www.menarinipatate.it