



**patata di qualità superiore a cottura  
soda, con ciclo medio precoce**

- ✓ colore della polpa giallo intenso
- ✓ alto rendimento
- ✓ calibro medio, molto uniforme, ottimo per il confezionamento
- ✓ alta conservabilità

SIMONETTA - una combinazione delle migliori caratteristiche

| Raccomandazioni di coltivazione                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Requisiti del campo                                                                                           |                                                                                                                                              | predilige condizioni di terreno medio-buone, con un apporto uniforme di acqua e sostanze nutritive                    |                                                                                   |           |
| <div>Semina</div> <div></div> | Dimensione del seme<br>35/50                                                                                                                 | Distanza tra le file                                                                                                  |                                                                                   | Tuberi/ha |
|                                                                                                               |                                                                                                                                              | 75 cm                                                                                                                 | 90 cm                                                                             |           |
|                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 28-30 cm                                                                          | 23-25 cm  |
|                                                                                                               | Profondità di semina                                                                                                                         | standard                                                                                                              |                                                                                   |           |
|                                                                                                               | Preparazione del seme                                                                                                                        | ha una buona dormienza; stimolare la germinazione in modo uniforme prima della semina (7-10 giorni)                   |                                                                                   |           |
| Trattamento del seme                                                                                          | trattamento contro Rhizoctonia solani raccomandata                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                   |           |
| Erbicidi                                                                                                      | se usato correttamente, non è nota alcuna sensibilità al metribuzin in pre-emergenza e una sensibilità media al metribuzin in post-emergenza |                                                                                                                       |                                                                                   |           |
| Fogliame                                                                                                      | media tenuta alle malattie fogliari; è necessario l'uso tempestivo e regolare di fungicidi contro la peronospora tardiva                     |                                                                                                                       |                                                                                   |           |
| Raccolta                                                                                                      | forma sensibile del tubero, quindi leggermente soggetta a danni; raccogliere delicatamente                                                   |                                                                                                                       |                                                                                   |           |
| Fertilizzazioneincl. ritorno della coltura precedente                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                   |           |
| Azoto (N)                                                                                                     | medio - rispetto allo standard locale (2/3 prima della semina e 1/3 successivamente)                                                         |                                                                                                                       |                                                                                   |           |
| Fosforo (P2O5)                                                                                                | 100 kg/ha (fosfato solubile in acqua alla semina)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                   |           |
| Potassio (K2O)                                                                                                | 350-270 kg/ha (possibile fino a 150 kg/ha di cloruro; su terreni più leggeri dosi frazionate)                                                |                                                                                                                       |                                                                                   |           |
| Magnesio (MgO)                                                                                                | 70 kg/ha (per il controllo della resa e della qualità)                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                   |           |
| Caratteristiche                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                   |           |
| Maturità                                                                                                      | medio-precoce                                                                                                                                | Tubero<br><br>Forma<br>Posizione degli occhi<br>Colore della polpa<br>Colore della pelle<br>Pelle<br>Numero di tuberi | lungo-ovale<br>superficiale<br>giallo intenso<br>giallo<br>liscio<br>medio - alto |           |
| Tipo di cottura                                                                                               | A - B                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                   |           |
| Qualità del consumo                                                                                           | scolorimento molto ridotto dopo la cottura; gusto eccellente                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                   |           |
| Rendimento                                                                                                    | resa elevata con calibro uniforme, alta resa commerciabile                                                                                   | Resistenze<br><br>Nematodi cisticoli<br>Rogna nera                                                                    | Ro1 (9)<br>2 (a), 18 (a)                                                          |           |
| Sviluppo della vegetazione                                                                                    | inizialmente lento, poi rapido                                                                                                               | Sensibilità<br><br>Scabbia comune<br>Anulatura<br>Ammaccatura<br>Danni meccanici                                      | molto basso - basso<br>molto basso - basso<br>molto basso - basso<br>medio        |           |
| Consevivabilità                                                                                               | molto dormiente, adatto allo stoccaggio a lungo termine                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                   |           |

(a) bassa sensibilità

Tutti i dati si basano su prove ufficiali di varietà e/o sulla nostra esperienza. Tuttavia, poiché le patate sono prodotti naturali, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per questi dettagli. (02/2025)