



**varietà tipologia export, ciclo  
intermedio, cottura prevalentemente  
soda**

- ✓ polpa di colore giallo chiaro
- ✓ molto resistente alla peronospora tardiva
- ✓ buona tolleranza alla siccità e al calore
- ✓ alte rese commerciabili

TAORMINA - alto potenziale di resa combinato con un'elevata tenuta del fogliame alle malattie

| Raccomandazioni di coltivazione                                                                               |                                                          |                                                                                                                                |          |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisiti del campo                                                                                           |                                                          | predilige condizioni di terreno medio-buone, con un apporto uniforme di acqua e sostanze nutritive                             |          |                                                                                                                    |
| <div>Semina</div> <div></div> | Dimensione del seme<br>35/50                             | Distanza tra le file                                                                                                           |          | Tuberi/ha                                                                                                          |
|                                                                                                               |                                                          | 75 cm                                                                                                                          | 90 cm    |                                                                                                                    |
|                                                                                                               |                                                          | 32-34 cm                                                                                                                       | 27-28 cm | 40.400                                                                                                             |
|                                                                                                               | per il confezionamento, avvicinare la pianta di 2 o 4 cm |                                                                                                                                |          |                                                                                                                    |
|                                                                                                               | Profondità di semina                                     | standard                                                                                                                       |          |                                                                                                                    |
|                                                                                                               | Preparazione del seme                                    | ha una buona dormienza; è sensibile alla rottura dei germogli; è utile uno shock termico breve prima della semina (3-4 giorni) |          |                                                                                                                    |
| Trattamento del seme                                                                                          | trattamento contro Rhizoctonia solani raccomandata       |                                                                                                                                |          |                                                                                                                    |
| Erbicidi                                                                                                      |                                                          | non si conoscono sensibilità se usato correttamente*                                                                           |          |                                                                                                                    |
| Fogliame                                                                                                      |                                                          | ottima salute delle foglie (peronospora tardiva)                                                                               |          |                                                                                                                    |
| Raccolta                                                                                                      |                                                          | standard                                                                                                                       |          |                                                                                                                    |
| Fertilizzazioneincl. ritorno della coltura precedente                                                         |                                                          |                                                                                                                                |          |                                                                                                                    |
| Azoto (N)                                                                                                     |                                                          | medio - rispetto allo standard locale (2/3 prima della semina e 1/3 successivamente)                                           |          |                                                                                                                    |
| Fosforo (P2O5)                                                                                                |                                                          | 100 kg/ha (fosfato solubile in acqua alla semina)                                                                              |          |                                                                                                                    |
| Potassio (K2O)                                                                                                |                                                          | 350-270 kg/ha (possibile fino a 80 kg/ha di cloruro; su terreni più leggeri dosi frazionate)                                   |          |                                                                                                                    |
| Magnesio (MgO)                                                                                                |                                                          | 70 kg/ha (per il controllo della resa e della qualità)                                                                         |          |                                                                                                                    |
| Caratteristiche                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                |          |                                                                                                                    |
| Maturità                                                                                                      |                                                          | medio-precoce                                                                                                                  |          | <div>Tubero</div> <div>Forma<br/>Posizione degli occhi<br/>Colore della polpa<br/>Pelle<br/>Numero di tuberi</div> |
| Tipo di cottura                                                                                               |                                                          | B                                                                                                                              |          |                                                                                                                    |
| Qualità del consumo                                                                                           |                                                          | bassa decolorazione dopo la cottura                                                                                            |          |                                                                                                                    |
| Rendimento                                                                                                    |                                                          | alte rese con calibri di grosse dimensioni                                                                                     |          | <div>Resistenze</div> <div>Nematodi cisticoli<br/>Rogna nera</div>                                                 |
| Sviluppo della vegetazione                                                                                    |                                                          | rapido                                                                                                                         |          | <div>Sensibilità</div> <div>Scabbia comune<br/>Anulatura<br/>Ammaccatura<br/>Danni meccanici</div>                 |
| Consevivabilità                                                                                               |                                                          | buona dormienza                                                                                                                |          |                                                                                                                    |

\* preliminare

Tutti i dati si basano su prove ufficiali di varietà e/o sulla nostra esperienza. Tuttavia, poiché le patate sono prodotti naturali, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per questi dettagli. (02/2025)