




## **mittelfrühe, vorwiegend festkochende Speisekartoffel**

- gelbe Fleischfarbe
- optisch sehr ansprechend
- sehr ertragsstark
- Vermarktungszeitraum frisch ab Feld bis Mai

MADEIRA - glatt, schick und packfähig, kombiniert mit einer sehr hohen Ertragsleistung

Anbauempfehlung				
<b>Standortansprüche</b>	mittlere bis bessere Böden; Standorte, die zu Schorf neigen, sollten gemieden werden			
<b>Pflanzung</b> 	<b>Pflanzgutsortierung</b> <b>35/50</b>	<b>Reihenweite</b>		<b>Knollen/ha</b>  43.000
		<b>75 cm</b>	<b>90 cm</b>	
	30-32 cm	25-27 cm		
	<b>Pflanztiefe</b>	ertragsstarke Standorte evtl. 2 cm tiefer pflanzen (max. 17 cm Erdbedeckung zum Häufeln)		
<b>Vorbereitung</b>	besitzt eine gute Keimruhe; Pflanzgut vor dem Legen gleichmäßig anwärmen (7-10 Tage)			
<b>Beizung</b>	gegen Rhizoctonia wird empfohlen			
<b>Herbizide</b>	ist empfindlich gegenüber Metribuzin im Nachauflauf; Einsatz vermeiden; Einsatz von Rimsulferon meiden			
<b>Blattgesundheit</b>	mittlere Blattgesundheit; rechtzeitiger und regelmäßiger Einsatz von Fungiziden gegen Krautfäule ist erforderlich			
<b>Ernte</b>	Standard			
Düngung inkl. Rücklieferung Vorfrucht für Ertragsniveau 500 dt/ha bei mittlerer Versorgungsstufe				
<b>Stickstoff (N)</b>	160 kg/ha inkl. Nmin, inkl. org. Düngung	2/3 vor dem Pflanzen und 1/3 nachdüngen		
<b>Phosphor (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>	100 kg/ha	wasserlösliches Phosphat zum Pflanzen		
<b>Kalium (K<sub>2</sub>O)</b>	350-270 kg/ha	< 35 BP Gaben teilen; bis 80 kg/ha Chlorid möglich		
<b>Magnesium (MgO)</b>	70 kg/ha	zur Ertrags- und Qualitätssicherung		
Sorteneigenschaften				
<b>Reifezeit</b>	mittelfrüh	<b>Knollenmerkmale</b>  Form Augenlage Fleischfarbe Schalenfarbe Schale Knollenzahl	rundoval sehr flach - flach gelb gelb glatt mittel - hoch	
<b>Speisewert</b>	vorwiegend festkochend; sehr stabile Fleischfarbe nach dem Kochen; guter Geschmack			
<b>Ertrag</b>	sehr hohe Knollenerträge mit hohem Marktwarenanteil für die Abpackung	<b>Resistenzen</b>  Nematoden Kartoffelkrebs	Ro1 (9), Ro4 (9) 1	
<b>Jugendentwicklung</b>	zügig	<b>Anfälligkeiten</b>  Schorf Eisenfleckigkeit Schwarzfleckigkeit Beschädigung	mittel sehr gering gering sehr gering - gering	
<b>Lagerung</b>	sehr keimruhig. Lagerung bis an den Anschluss (Mai/Juni)			

Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für die Angaben übernommen werden. (Stand 06/2021)