



EUROPLANT

CONCORDIA



## **mittelfröhe, vorwiegend festkochende Qualitätsspeisesorte**

- ✓ gelbe Fleischfarbe
- ✓ ovale, ansprechende Knollenform mit glatter Schale
- ✓ hohe Marktwarenenerträge
- ✓ Lagersorte

CONCORDIA - setzt mit ihrer ansprechenden Formstabilität, Waschfähigkeit und guten Speisequalität neue Maßstäbe

| Anbauempfehlung                                                                                                  |                                  |                                                                                        |                                                                                                   |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Standortansprüche                                                                                                |                                  | bevorzugt mittlere bis bessere Böden mit gleichmäßiger Wasser- und Nährstoffversorgung |                                                                                                   |                                                        |
| <div>Pflanzung</div> <div></div> | Pflanzgutsortierung<br>35/50     | Reihenweite                                                                            |                                                                                                   | Knollen/ha                                             |
|                                                                                                                  |                                  | 75 cm                                                                                  | 90 cm                                                                                             |                                                        |
|                                                                                                                  |                                  |                                                                                        | 28-30 cm                                                                                          | 23-25 cm                                               |
|                                                                                                                  | Pflanztiefe                      | Standard                                                                               |                                                                                                   |                                                        |
|                                                                                                                  | Vorbereitung                     | besitzt eine gute Keimruhe; Pflanzgut vor dem Legen gleichmäßig anwärmen (7-10 Tage)   |                                                                                                   |                                                        |
| Beizung                                                                                                          | gegen Rhizoctonia wird empfohlen |                                                                                        |                                                                                                   |                                                        |
| Herbizide                                                                                                        |                                  | bei sachgerechter Anwendung sind keine Empfindlichkeiten bekannt                       |                                                                                                   |                                                        |
| Blattgesundheit                                                                                                  |                                  | gute, durchschnittliche Blattgesundheit                                                |                                                                                                   |                                                        |
| Ernte                                                                                                            |                                  | auf schonendes Roden ist zu achten                                                     |                                                                                                   |                                                        |
| Düngung inkl. Rücklieferung Vorfrucht für Ertragsniveau 500 dt/ha bei mittlerer Versorgungsstufe                 |                                  |                                                                                        |                                                                                                   |                                                        |
| Stickstoff (N)                                                                                                   |                                  | 160 kg/ha inkl. Nmin, inkl. org. Düngung                                               | 2/3 vor dem Pflanzen und 1/3 nachdüngen                                                           |                                                        |
| Phosphor (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )                                                                        |                                  | 100 kg/ha                                                                              | wasserlösliches Phosphat zum Pflanzen                                                             |                                                        |
| Kalium (K <sub>2</sub> O)                                                                                        |                                  | 350-270 kg/ha                                                                          | < 35 BP Gaben teilen; bis 150 kg/ha Chlorid möglich                                               |                                                        |
| Magnesium (MgO)                                                                                                  |                                  | 70 kg /ha                                                                              | zur Ertrags- und Qualitätssicherung                                                               |                                                        |
| Sorteneigenschaften                                                                                              |                                  |                                                                                        |                                                                                                   |                                                        |
| Reifezeit                                                                                                        |                                  | mittelfrüh                                                                             | Knollenmerkmale<br><br>Form<br>Augenlage<br>Fleischfarbe<br>Schalenfarbe<br>Schale<br>Knollenzahl | oval<br>flach<br>gelb<br>gelb<br>glatt<br>mittel       |
| Speisewert                                                                                                       |                                  | vorwiegend festkochend, sehr geringe Kochdunklung, sehr gute Schäleignung              |                                                                                                   |                                                        |
| Ertrag                                                                                                           |                                  | mittlere bis hohe Erträge bei ausgeglichener Sortierung                                | Resistenzen<br><br>Nematoden<br>Kartoffelkrebs                                                    | Ro1, Ro4<br>1 (a)                                      |
| Jugendentwicklung                                                                                                |                                  | zügig                                                                                  | Anfälligkeiten<br><br>Schorf<br>Eisenfleckigkeit<br>Schwarzfleckigkeit<br>Beschädigung            | gering - mittel<br>gering<br>gering<br>gering - mittel |
| Lagerung                                                                                                         |                                  | gute Keimruhe, Lagerung bis Ende Frühjahr                                              |                                                                                                   |                                                        |

(a) geringe Anfälligkeit

Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für die Angaben übernommen werden. (Stand 07/2022)