



EUROPLANT


EMILIANA



mittelfröhe, festkochende Premium-Salatkartoffel

- ✓ tiefgelbe Fleischfarbe
- ✓ hohe Marktwarenerträge
- ✓ prämierte Speisequalität
- ✓ keimruhige Lagersorte

EMILIANA - Salatqualität der Spitzenklasse für die Langzeitlagerung

| Anbauempfehlung | | | | |
|--|---|--|--|-------------------|
| Standortansprüche | bevorzugt mittlere bis bessere Böden mit gleichmäßiger Wasser- und Nährstoffversorgung | | | |
| Pflanzung  | Pflanzgutsortierung 35/50 | Reihenweite | | Knollen/ha |
| | | 75 cm | 90 cm | |
| | | 30-32 cm | 25-27 cm | 43.000 |
| | Pflanztiefe | Standard | | |
| | Vorbereitung | besitzt eine gute Keimruhe; reagiert empfindlich auf Keimbruch; ein Temperaturstoß kurz vor dem Pflanzen (3-4 Tage) ist förderlich | | |
| Beizung | gegen Rhizoctonia wird empfohlen | | | |
| Herbizide | bei sachgerechter Anwendung sind keine Empfindlichkeiten bekannt | | | |
| Blattgesundheit | mittlere Blattgesundheit; rechtzeitiger und regelmäßiger Einsatz von Fungiziden gegen Krautfäule ist ratsam | | | |
| Ernte | zügige und schonende Ernte nach Erreichen der Schalenfestigkeit | | | |
| Düngung inkl. Rücklieferung Vorfrucht für Ertragsniveau 500 dt/ha bei mittlerer Versorgungsstufe | | | | |
| Stickstoff (N) | 160 kg/ha inkl. Nmin, inkl. org. Düngung | 2/3 vor dem Pflanzen und 1/3 nachdüngen | | |
| Phosphor (P₂O₅) | 100 kg/ha | wasserlösliches Phosphat zum Pflanzen | | |
| Kalium (K₂O) | 350-270 kg/ha | < 35 BP Gaben teilen; bis 150 kg/ha Chlorid möglich | | |
| Magnesium (MgO) | 70 kg/ha | zur Ertrags- und Qualitätssicherung | | |
| Sorteneigenschaften | | | | |
| Reifezeit | mittelfrüh | Knollenmerkmale | oval flach tiefgelb gelb glatt - genetzt mittel - hoch | |
| Speisewert | festkochend; sehr geringe Kochdunklung; Geschmack der Extraklasse | | | |
| Ertrag | hohe Erträge bei einer gleichmäßigen, engen Sortierung; hohe Marktwarenerträge | Resistenzen | Nematoden Kartoffelkrebs Ro1 (9) 1, 18 (a) | |
| Jugendentwicklung | verhalten, später zügig | Anfälligkeiten | Schorf Eisenfleckigkeit Schwarzfleckigkeit Beschädigung gering - mittel gering - mittel sehr gering sehr gering | |
| Lagerung | gute Keimruhe, Lagerung bis an den Anschluss (Mai/Juni) | | | |

(a) geringe Anfälligkeit

Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für die Angaben übernommen werden. (Stand 07/2022)