

EUROFIT - mittelfrühe Stärkesorte mit breiter Nematoden- und Krebsresistenz

Anbauempfehlung				
Standortansprüche		mittlere bis bessere Böden; Standorte, die zu Eisenfleckigkeit neigen, sollten gemieden werden		
Pflanzung 	Ø g /Knolle	Reihenweite		Knollen/ha
		75 cm	90 cm	
	70 g	35 cm	29 cm	38.500
	80 g	39 cm	33 cm	34.100
	Pflanztiefe	Standard		
	Vorbereitung	besitzt eine gute Keimruhe; Pflanzgut vor dem Legen gleichmäßig anwärmen (7-10 Tage)		
	Beizung	gegen Rhizoctonia wird empfohlen		
Herbizide		bei sachgerechter Anwendung sind keine Empfindlichkeiten bekannt		
Blattgesundheit		mittlere Blattgesundheit; rechtzeitiger und regelmäßiger Einsatz von Fungiziden gegen Krautfäule ist erforderlich		
Ernte		auf schonendes Roden ist zu achten		
Düngung inkl. Rücklieferung Vorfrucht für Ertragsniveau 500 dt/ha bei mittlerer Versorgungsstufe				
Stickstoff (N)		180 kg/ha inkl. Nmin, inkl. org. Düngung	2/3 vor dem Pflanzen und 1/3 nachdüngen	
Phosphor (P ₂ O ₅)		100 kg/ha	wasserlösliches Phosphat zum Pflanzen	
Kalium (K ₂ O)		250-190 kg/ha	< 35 BP Gaben teilen; bis 80 kg/ha Chlorid möglich	
Magnesium (MgO)		70 kg/ha	zur Ertrags- und Qualitätssicherung	
Sorteneigenschaften				
Reifezeit		mittelfrüh	Knollenmerkmale	rundoval mittel hellgelb gelb rau hoch
Stärkegehalt und -leistung		zeigt sehr hohe Ertragsleistungen bei hohen Knollenzahlen mit hohem Stärkegehalt		
Ertrag		hohe Knollenerträge	Resistenzen	Ro1 (9), Ro2/3 (8), Ro5 (8) Pa2 (9), Pa3 (9) tolerant 1, 2 (a) 6, 8/18
Jugendentwicklung		verhalten, später zügig		
Lagerung		gute Keimruhe, Lagerung bis zum Frühjahr	Nematodentoleranz Kartoffelkrebs	Anfälligkeiten
			Schorf Eisenfleckigkeit Schwarzfleckigkeit Beschädigung	
				mittel hoch hoch mittel - hoch

Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für die Angaben übernommen werden. (Stand 05/2026)