

EUOMIRA - mittelspäte Stärkesorte mit hohem Stärkeertrag bei mittelgroßen Knollen

Anbauempfehlung				
Standortansprüche		bevorzugt mittlere bis bessere Böden mit gleichmäßiger Wasser- und Nährstoffversorgung		
Pflanzung 	Ø g/ Knolle	Reihenweite		Knollen/ha
		75 cm	90 cm	
	70 g	35 cm	29 cm	38.500
	80 g	39 cm	33 cm	34.100
	Pflanztiefe	Standard		
	Vorbereitung	keine besondere Vorbereitung nötig		
	Beizung	gegen Rhizoctonia wird empfohlen		
Herbizide		bei sachgerechter Anwendung sind keine Empfindlichkeiten bekannt		
Blattgesundheit		mittlere Blattgesundheit; rechtzeitiger und regelmäßiger Einsatz von Fungiziden auch gegen Alternaria wird empfohlen		
Ernte		auf schonendes Roden ist zu achten		
Düngung inkl. Rücklieferung Vorfrucht für Ertragsniveau 500 dt/ha bei mittlerer Versorgungsstufe				
Stickstoff (N)		160 kg/ha inkl. Nmin, inkl. org. Düngung	1/2 vor dem Pflanzen und 1/2 nachdüngen	
Phosphor (P ₂ O ₅)		100 kg/ha	wasserlösliches Phosphat zum Pflanzen	
Kalium (K ₂ O)		250-190 kg/ha	< 35 BP Gaben teilen; bis 80 kg/ha Chlorid möglich	
Magnesium (MgO)		70 kg/ha	zur Ertrags- und Qualitätssicherung	
Sorteneigenschaften				
Reifezeit		mittelspät	Knollenmerkmale Form Augenlage Fleischfarbe Schalenfarbe Schale Knollenzahl	rund mittel - tief weiß - creme gelb genetzt mittel
Stärkegehalt und -leistung		hohe Stärkerträge durch hohe Ertragsleistung		
Ertrag		hohe Ertragsleistung mit mittelfallender Sortierung		
Jugendentwicklung		zügig	Resistenzen Nematoden Kartoffelkrebs	Ro1 (9), Ro2/3 (8), Ro5 (8) Pa2 (9), Pa3 (9) 1, 2 (a), 6 (a) 8/18 (a)
Lagerung		gute Keimruhe, Lagerung bis zum Frühjahr		
			Anfälligkeiten Schorf Eisenfleckigkeit Schwarzfleckigkeit Beschädigung	mittel - hoch mittel - hoch hoch mittel

Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für die Angaben übernommen werden. (Stand 05/2026)