



EUROPLANT

SIMONETTA



## **mittelfröhe, festkochende Qualitätsspeisekartoffel**

- ✓ tiefgelbe Fleischfarbe
- ✓ ertragreich
- ✓ ausgewogene Abpacksortierung
- ✓ hohe Lagereignung

[www.europlant.biz](http://www.europlant.biz)

SIMONETTA - die Kombination bester Eigenschaften vereint in einer Sorte

| Anbauempfehlung                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Standortansprüche                                                                                                |                                  | bevorzugt mittlere bis bessere Böden mit gleichmäßiger Wasser- und Nährstoffversorgung                                          |                                                                                                   |                                                                                |
| <div>Pflanzung</div> <div></div> | Pflanzgutsortierung<br>35/50     | Reihenweite                                                                                                                     |                                                                                                   | Knollen/ha                                                                     |
|                                                                                                                  |                                  | 75 cm                                                                                                                           | 90 cm                                                                                             |                                                                                |
|                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                 | 28-30 cm                                                                                          | 23-25 cm                                                                       |
|                                                                                                                  | Pflanztiefe                      | Standard                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                |
|                                                                                                                  | Vorbereitung                     | besitzt eine gute Keimruhe; Pflanzgut vor dem Legen gleichmäßig anwärmen (7-10 Tage)                                            |                                                                                                   |                                                                                |
| Beizung                                                                                                          | gegen Rhizoctonia wird empfohlen |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                |
| Herbizide                                                                                                        |                                  | bei sachgerechter Anwendung ist im Voraufbau keine und im Nachaufbau eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Metribuzin bekannt |                                                                                                   |                                                                                |
| Blattgesundheit                                                                                                  |                                  | mittlere Blattgesundheit; rechtzeitiger und regelmäßiger Einsatz von Fungiziden gegen Krautfäule ist erforderlich               |                                                                                                   |                                                                                |
| Ernte                                                                                                            |                                  | Salatform - daher leichte Beschädigungsneigung - schonend roden                                                                 |                                                                                                   |                                                                                |
| Düngung inkl. Rücklieferung Vorfrucht für Ertragsniveau 500 dt/ha bei mittlerer Versorgungsstufe                 |                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                |
| Stickstoff (N)                                                                                                   |                                  | 140 kg/ha inkl. Nmin, inkl. org. Düngung                                                                                        | 2/3 vor dem Pflanzen und 1/3 nachdüngen                                                           |                                                                                |
| Phosphor (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )                                                                        |                                  | 100 kg/ha                                                                                                                       | wasserlösliches Phosphat zum Pflanzen                                                             |                                                                                |
| Kalium (K <sub>2</sub> O)                                                                                        |                                  | 350-270 kg/ha                                                                                                                   | < 35 BP Gaben teilen; bis 150 kg/ha Chlorid möglich                                               |                                                                                |
| Magnesium (MgO)                                                                                                  |                                  | 70 kg/ha                                                                                                                        | zur Ertrags- und Qualitätssicherung                                                               |                                                                                |
| Sorteneigenschaften                                                                                              |                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                |
| Reifezeit                                                                                                        |                                  | mittelfrüh                                                                                                                      | Knollenmerkmale<br><br>Form<br>Augenlage<br>Fleischfarbe<br>Schalenfarbe<br>Schale<br>Knollenzahl | langoval<br>flach<br>tiefgelb<br>gelb<br>glatt<br>mittel - hoch                |
| Speisewert                                                                                                       |                                  | festkochend, sehr geringe Kochdunklung, vorzüglicher Geschmack                                                                  |                                                                                                   |                                                                                |
| Ertrag                                                                                                           |                                  | hohe Erträge bei einer ansprechenden, ausgewogenen Sortierung; hoher Marktwarenertrag                                           | Resistenzen<br><br>Nematoden<br>Kartoffelkrebs                                                    | Ro1 (9)<br>2 (a), 18 (a)                                                       |
| Jugendentwicklung                                                                                                |                                  | verhalten, später zügig                                                                                                         | Anfälligkeiten<br><br>Schorf<br>Eisenfleckigkeit<br>Schwarzfleckigkeit<br>Beschädigung            | sehr gering - gering<br>sehr gering - gering<br>sehr gering - gering<br>mittel |
| Lagerung                                                                                                         |                                  | sehr keimruhig, Lagerung bis an den Anschluss (Mai/Juni)                                                                        |                                                                                                   |                                                                                |

(a) geringe Anfälligkeit

Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für die Angaben übernommen werden. (Stand 07/2022)